




CBD



生物多样性公约

Distr.
GENERAL

UNEP/CBD/SBSTTA/18/4/Add.1
19 June 2014**

CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

科学、技术和工艺咨询附属机构
第十八次会议
2014年6月23日至28日，蒙特利尔
临时议程*项目4.1

海洋和沿海生物多样性： 关于描述符合具有重要生态或生物意义的海洋区域的 科学标准的区域的汇总报告草案¹

增编

执行秘书的说明

背景

1. 根据第X/29号决定第36段和第XI/17号决定第12段，生物多样性公约执行秘书又举办了以下七次区域讲习班：

- (a) 南印度洋（2012年7月31日至8月3日，毛里求斯佛力克昂佛勒克）；²
- (b) 东部太平洋热带和温带（2012年8月28日至31日，厄瓜多尔克隆群岛）；³
- (c) 北太平洋（2013年2月25日至3月1日，俄罗斯联邦莫斯科）；⁴

* UNEP/CBD/SBSTTA/18/1。

**6月19日重新张贴，对第57页表5的方框3作出技术性更正。

¹本说明所用名称及其材料的编制方式并不意味着秘书处对于任何国家、领土、城市或地区、或其当局的法律地位，或对于其边界的划分，表示任何意见。

²报告和文件可访问：<http://www.cbd.int/doc/?meeting=EB5A-SIO-01>。

³报告和文件可访问：<http://www.cbd.int/doc/?meeting=EB5A-ETTP-01>。

⁴报告和文件可访问：<http://www.cbd.int/doc/?meeting=EB5A-NP-01>。

为尽可能减少秘书处工作的环境影响和致力于秘书长提出的“不影响气候的联合国”的倡议，本文件印数有限。请各代表携带文件到会，不索取更多副本。

- (d) 东南大西洋（2013年4月8日至12日，纳米比亚斯瓦科普蒙德）；⁵
- (e) 北极（2014年3月3日至7日，芬兰赫尔辛基）；⁶
- (f) 西北大西洋（2014年3月24日至28日，加拿大蒙特利尔）；⁷以及
- (g) 地中海（2014年4月7日至11日，西班牙马拉加）。⁸

2. 根据第 XI/17 号决定第 12 段，下文表 1 至表 7 分别概述了这些区域讲习班的成果，而对这些区域如何符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的全文描述载于这些讲习班各自报告的附件 (UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4、UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4、UNEP/CBD/EBSA/NP/1/4、UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4、UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5、UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4、UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4) 之中。

3. 在第 X/29 号决定的第 26 段，缔约方大会注意到应用具有重要生态或生物意义的海洋区域的标准是一项科学和技术工作，对发现符合该标准的区域可能需要采取加强保护和管理的措施，可以通过很多手段包括海洋保护区和影响评估这样做，同时强调，查明具有重要生态或生物意义的海洋区域和选定保护及管理措施，是由国家和主管政府间组织遵循包括《联合国海洋法公约》在内的国际法办理的事务。

4. 对符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的海洋区域的描述并不意味着对于任何国家、领土、城市或地区、或其当局的法律地位，或对于其边界的划分，表示任何意见。也不涉及任何经济或法律问题，仅只是一项科学技术活动。

表格的略语：

具有重要生态或生物意义的海洋 区域标准的排序	标准
相关性	<ul style="list-style-type: none"> • C1: 独特性或稀有性 • C2: 对物种生长阶段的特别重要性 • C3: 对受威胁、并未或数目减少物种和（或）生境的重要性 • C4: 易受伤害性、脆弱性、敏感性或恢复缓慢 • C5: 生物生产力 • C6: 生物多样性 • C7: 自然性
H: 高	
M: 中等	
L: 低；	
-:没有资料	

⁵ 报告和文件可访问：<http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSA-SEA-01>。

⁶ 报告和文件可访问：<http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-01>。

⁷ 报告和文件可访问：<http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-02>。

⁸ 报告和文件可访问：<http://www.cbd.int/doc/?meeting=EBSAWS-2014-03>。

表 1. 对南印度洋符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的区域的描述

(详细内容载于《促进描述具有重要生态或生物意义的海洋区域 (EBSAs) 的南印度洋区域讲习班报告》附件四的附录,
UNEP/CBD/RW/EBSA/SIO/1/4)

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
1. 厄加勒斯浅滩繁殖区 <ul style="list-style-type: none">位置：南纬 34-36°和东经 20-23°之间。整个地区位于南非领海和专属经济区内。作为一个产卵场和繁殖区，它是许多暖温带物种的聚集中心，其中包括一些地方性的鲷科鱼。北方狭窄大陆架上物种产卵的唯一暖温带育苗区，对物种的保留、补充和喂养非常重要。丰富的底栖桡足类群落提供了丰富的食物来源。该地区包括极度濒危的淤泥泥生境和支持冷水珊瑚群落的独特知名火山近海珊瑚礁。本区域内有濒危岩礁鱼类南非强齿鲷的产卵聚集区。这个区域已被两个系统的规划举措确定为重要的生境。	H	H	H	M	M	M	M
2. 厄加勒斯的斜坡和海底山 <ul style="list-style-type: none">位置：位于南部非洲大陆架边缘南端的厄加勒斯浅滩制顶端，范围：南纬 35-38°和东经 21-23°之间。厄加勒斯浅滩南端的外围是大片生产率高、多为浮游和底栖生境异质性的近海区域。厄加勒斯和本格拉南部生态区域在这里交汇，大陆架边缘零星的上升流提高了外围的生产能力。该地区是沙丁鱼、凤尾鱼、竹荚鱼和鳕鱼的产卵区。厄加勒斯浅滩的这个区域被视为重要的产卵区。这里的漩涡帮助近海水实现再循环，并将重要的繁殖区与大陆架边缘的产卵生境连接起来。由于其丰富的生境多样性，国家空间计划将这个区域认定为重点区域。	M	H	M	H	H	H	H
3. 伊丽莎白港的近海地区 <ul style="list-style-type: none">位置：距南非专属经济区内伊丽莎白港上斜坡的海岸线（南纬 33 至 35°和东经 25 至 27°之	M	H	H	M	H	H	L

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
间)。							
<ul style="list-style-type: none"> 该区域包括空间范围有限的一些罕见的生境类型，被认为是支持重要生态过程的一个重要的底栖和浮游区。在这里阿古拉斯海流沿着大陆架间隙流出海岸，并完成复杂的循环。冷水漩涡、阿古拉斯水流流入大陆架以及近海阿古拉斯海流的奔流都发生在这里。这里是海鸟（包括濒危的非洲企鹅）的繁殖和觅食区,其中还包括产卵区、繁殖区以及底栖和远洋鱼类的重要流经通道。这里也是濒危棱皮龟的生活区。潜在的脆弱生境和物种包括海底峡谷、陡峭的大陆架边缘、深礁、外陆架及大陆架边缘砾石，及 100 至 1,000 米深海中的造礁冷水珊瑚。 							
4. 霸王花海堤和沙丁鱼路线	H	H	M	M	M	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 30-32°和东经 30-31°之间。 这个区域包括几种鱼类的重要迁移路线（又称为沙丁鱼迁移）和生境非常复杂的离岸区。底栖生物特性包括一个独特的深水暗礁系统称为霸王花海堤、陡峭的大陆架边缘和斜坡，以及四个海底峡谷。沙丁鱼迁移是顶级觅食捕食者，包括海鸟、哺乳动物、鲨鱼和游钓鱼类等的临时特性。据称，霸王花海堤是石首鱼科和鲷科鱼的聚集产卵区。其中一些物种正在减少，认为它们受到了威胁。这个区域的生产力为中等，沙丁鱼迁移是一个重要的生态过程，有利于营养物质从生产力更高的厄加勒斯浅滩向北转移到营养更加贫乏的环境。 							
5. 纳塔尔湾	M	H	H	M	H	L	L
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南非东海岸，邓福德港到尤姆杰奈河近岸，绵延 2,000 米，包括图盖拉河岸、纳塔尔湾繁殖区、大陆架边缘和上游深海区。 纳塔尔湾对许多生态过程，包括陆海洋连接、幼虫保留和补充都很重要，提供重要的繁殖区和觅食区。这里有罕见的生境类型，支持一些已知物种在少数地方存在。大量冷水 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
经厄加勒斯推动的上涌细胞流入大陆架，来自图盖拉河的大陆径流对淤泥和其他未固结沉积物栖息地的维护非常重要。浑浊和营养丰富的环境对甲壳类动物、底栖鱼类、洄游性鱼类、海龟和鲨鱼以及某些濒危生物的生命阶段非常重要。潜在脆弱的海洋生态系统和物种包括海底峡谷、冷水珊瑚和生长缓慢的鲷科鱼。							
6. 科马提河到蓬塔—杜欧鲁（莫桑比克南部）							
<ul style="list-style-type: none"> 位置：科马提湾。这个区域涵盖科马提河口马普托湾、拉戈阿湾、Baixo Danae 区域、伊尼卡岛南端到蓬塔—杜欧鲁的整个海岸线和公海（莫桑比克和南非夸祖鲁-纳塔尔省之间的边界）。 海湾是丰富多样和重要的藏匿生境（例如，茂密的红树林、广袤的海草床和赤道非洲最南端南部最大的珊瑚礁，此外还有多沙和岩石嶙峋的海滩、粗糙而温柔的海岸线等）。虽然这里面积非常小，但却蕴含多样性非常丰富不同类群，包括具有商业意义的渔业和虾。海湾也是受到特殊关注的几种物种的栖息地，如儒艮、海豚、三种龟（棱皮龟、蠵龟和绿龟）、鲨鱼、鲸鱼、海马、濒危双壳类和脆弱的海草丛生大叶藻。伊尼卡岛是南部非洲所有鸟类中 33% 的鸟类的栖息地。该地区是伊尼卡岛和马昌古罗半岛海洋和陆地储量的所在地。 	M	M	H	M	H	H	M
7. 德拉诺大陆架边缘、峡谷和斜坡							
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 26-29° 和东经 32-34° 之间。这一区域涵盖目前马普塔兰南部、北部和海岸以及伊西曼格利索湿地公园的圣卢西亚海洋保护区。 该地区是濒临灭绝的棱皮龟的重要海上栖息地，其中包括座头鲸的一条重要的迁徙路线、公牛鲨的繁殖区、鱼（特有的鲷科鱼）和鲨鱼的产卵区以及腔棘鱼、海洋哺乳动物和鲨鱼等其他濒危物种的栖息地。潜在的脆弱海洋生态系统包括许多海底峡谷、古海岸线、深礁和硬陆架边缘，而硬陆架边缘的造礁冷水珊瑚也在水深超过 900 米处恢复。这 	M	H	M	M	M	H	H

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
里是鲸鲨的季节性饲养区。							
8. 萨韦河到蓬塔—圣塞瓦斯蒂安（莫桑比克中部）	H	H	H	M	H	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 位置：巴扎鲁托群岛距离莫桑比克海岸 20 公里，位于南纬 21°30'-22°10' 和东经 35°22'-35°30' 之间。这个区域符合具有重要的生态或生物意义海洋区域的标准，覆盖南纬约为 21° 21.300' 和东经为 35° 30.200' 的 12 英里岩礁。 此区域主要涵盖巴扎鲁托群岛，该群岛是东非儒艮种群最多的地区，也是一个海洋保护区。这一地区有许多大型动物，如儒艮、海龟、海豚和马林鱼，以及海草草地和红树林。 							
9. 莫伦贝内到扎沃拉角湾（莫桑比克南部）	H	H	H	M	H	H	L
<ul style="list-style-type: none"> 位置：西北入口处到伊尼扬巴内湾。该区域包括伊尼扬巴内湾、半岛、从托佛到扎沃拉角（包括波梅内和潘达内区域）。 这一区域拥有丰富的巨型动物，主要是被称为世界最大种群的暗礁鱼、巨型蝠鲼和鲸鲨。这里还有儒艮、五种龟、珊瑚礁（其中一个独特），以及海草床面积宽广的红树林，主要集中在莫伦贝内和伊尼扬巴内湾。该地区是新的研究点，最近在波梅内/扎沃拉角发现了裸鳃亚目的新品种，它证明了莫桑比克这个生物多样性新的热点的价值。 							
10. 克利马内到祖尼河（赞比西河三角洲）	H	H	M	L	H	-	M
<ul style="list-style-type: none"> 位置：该地区从河吉兆河一直延伸到南部的祖尼河（欣代中间，三角洲主要分支到贝拉市）。 增量形成了索法拉河岸，索法拉河岸从萨韦河延伸到 Ilhas Primeiras e Segundas 的岛屿链，是莫桑比克最大也是产量最高的渔业水域，其产量在全部产业捕鱼量中接近 50%（2002 年约为 50,000 吨）。索法拉河岸以赞比西三角洲为代表（克利马内到祖尼河， 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
海岸线约为 200 公里）。渔业区的产量同赞比西河三角洲广袤的红树林直接相关。这片红树林是东非最大的红树林，面积约为 100,000 公顷。							
11. 阿古拉斯锋 <ul style="list-style-type: none">• 位置：东经 20-83° 和南纬 36-44°。位于印度洋内国家管辖范围以外的海洋区域。• 在印度洋国家管辖范围外的区域，这里的产量尤其高，生物群物种非常丰富，包括稀有和濒危物种，如南方蓝鳍金枪鱼、南露脊鲸、鳍足类动物和海鸟，包括特有的极度濒危阿姆斯特丹信天翁。	H	H	H	M	H	M	L
12. 坦噶腔棘鱼海洋公园 <ul style="list-style-type: none">• 位置：位于南纬 5° 03' 37" 和东经 39° 14' 41"、南纬 5° 24' 13"、东经 39° 08' 12"、南纬 5° 21' 39" 和东经 39° 01' 55" 以及南纬 5° 03' 21" 和东经 39° 03' 21" 之间。• 坦噶腔棘鱼海洋公园有腔棘鱼。腔棘鱼是世界上最稀有、最神秘的深海鱼，之前曾认为已经灭绝。科学的研究和在该地区使用遥控录像仪显示，腔棘鱼生活在 150 至 200 米水深的洞穴中。	H	L	H	M	L	M	L
13. 奔巴-希莫尼-基西特 <ul style="list-style-type: none">• 位置：南纬 04° 50' 和 05° 30' 之间。• 奔巴海峡生活着各种鱼类，包括中上层鱼、海龟、海豚、海牛和鲸鱼。基西特-姆彭古蒂区位于肯尼亚南部海岸的希莫尼区域，包括肯尼亚最大的禁捕区（28 平方公里）基西特海洋公园和附近肯尼亚最小的保护区（11 平方公里）姆彭古蒂海洋保护区。这里的海洋物种丰富，包括珊瑚、珊瑚鱼和海龟，也是珍稀特有物种椰子蟹的重要生活区。基西特岛是一个重要鸟类栖息地，这里生活的许多物种，如乌燕鸥和数量庞大的（最多时有 1,000 对在进行繁殖）凤头燕鸥和粉红燕鸥，这里有范围广泛的栖息地，包括红树林、	H	M	M	M	M	M	L

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
珊瑚礁、海草床和近海水域，这被认为是重要的鱼类育苗场。因此，奔巴岛-希莫尼-基西特区是海洋哺乳动物以及各种珊瑚和相关鱼类物种的重要栖息地。							
14. Baixo Pinda- Pebane (普里梅拉斯岛和塞贡达斯岛)	M	M	M	M	M	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 14.2°-18° 和东经 38°- 41.5°。 这里的生产量很高，拥有原始的珊瑚礁。它也包括圣拉扎罗的渔场（安戈谢南部到纳卡拉/莫桑比克岛）。Baixo Pinda 是莫桑比克复杂泻湖和潮间独特沿海区域的典型。这里生活着独特的鱼类和特有的]微藻物种长心卡帕藻。此外，纳卡拉和莫桑比克岛附近有几个海底峡谷。 							
15. 桑给巴尔岛（安古迦岛）-萨阿达尼	M	M	M	M	M	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 5.50°-6.9° 和东经 38.7°- 39.8°。 桑给巴尔岛（安古迦岛）-萨阿达尼生活着相对非常高的重要生物物种，如鲨鱼、海豚、儒艮、虾和海龟。该地区是许多鳍鱼类和甲壳类动物的栖息地，也是著名的沿海旅游风景区，这是因为这里深受珊瑚、鳍鱼类和贝类喜爱，生物多样性非常丰富。 							
16. 鲁菲吉-马菲亚—基卢瓦	M	M	M	M	H	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 7.1°-9.0° 和东经 39.2°- 40.6°。 这里生活着数量庞大的各种濒危海洋物种，如儒艮、海龟、腔棘鱼和其他鳍鱼、甲壳类动物和鸟类。在马菲亚、基卢瓦和鲁菲吉河三角洲海岸发现了连绵不绝的最大红树林区。 							
17. 瓦塔穆区	M	M	M	M	M	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 位置：东经 39.9° 和南纬 3.5° 及东经 40.2° 和南纬 3.3°。 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 这一地区的栖息地包括潮间带岩石、沙子和泥巴、裙礁和珊瑚园、珊瑚崖、沙滩和米达河红树林。海洋生物包括鱼、海龟、儒艮和螃蟹。这一地区周围部分是米达河森林，有非常丰富的红树林物种，包括角果木、红茄苳、木榄、白骨壤 和杯萼海桑。这些栖息地为各种留鸟和候鸟种提供栖息地。 							
18. 奔巴湾-姆特瓦拉（莫桑比克海峡的一部分） <ul style="list-style-type: none"> 位置：莫桑比克北部的奔巴岛湾，距鲁伍马河口和坦桑尼亚南部姆特瓦拉-姆纳兹湾的珊瑚礁系统 400 公里。 莫桑比克北部的奔巴岛湾，距鲁伍马河口和坦桑尼亚南部姆特瓦拉-姆纳兹湾的珊瑚礁系统 400 公里。该群岛是该地区（以及莫桑比克北部）珊瑚最多的地区，拥有 60 个类别的近 300 个珊瑚。富有魅力的物种包括海龟、海牛和大象及许多珍稀特有植物物种。 	H	M	M	H	H	H	L
19. 莫桑比克海峡 <ul style="list-style-type: none"> 位置：该地区横跨莫桑比克海峡，从坦桑尼亚南部的姆特瓦拉到马达加斯加的东北角，向南延伸到马达加斯加的东南端和南非的圣西亚灯塔。 莫桑比克海峡拥有全球独有的涡流和环流，形成了印度洋西部边界的庞大西边界流厄加勒斯暖流。海峡的地质和海洋学深刻地影响着这个海峡的生态系统动态和生境。海峡的独特涡流动态和马达加斯加高原的上升流形成了联系紧密、非常丰富的浅水底栖和浮游海洋生物群落，影响珊瑚礁、浮游生物和浮游群落的生产力、动物区系群体，包括大型鱼类、海龟、海鸟和海洋哺乳动物的空间和时间活动。 	H	H	H	H	H	M	H

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
20. 法属印度洋诸岛（莫桑比克海峡的一部分） • 位置：法属印度洋诸岛横跨非洲东海岸延伸到马达加斯加东海岸之间的莫桑比克海峡。格洛里厄斯群岛（南纬 11.3°）位于法属印度洋诸岛北部，新胡安岛在中间，而印度礁和欧罗巴岛（南纬 22.4°）位于该地区的南部。	H	H	M	H	H	M	H
21. 拉穆-基温加区域 • 位置：这一区域覆盖东经 40.3° 和南纬 3.2° 及东经 41.9° 和南纬 1.5° 的地区。 • 肯尼亚东北部、毗邻索马里边界的印度洋海岸地区拉穆区的红树林和潮滩生境非常出名，因为这里是东非整个海岸沿线最广泛且物种丰富的地区。它们在生物多样性、气候保护（蓝炭）、渔业、自然旅游和沿海保护方面具有宝贵价值。	M	M	M	M	M	M	L
22. 沃尔特斯浅滩 • 位置：南纬 33°9'-16' 和东经 43°49'-56'。确定的底部等深线为 800 米。 • 沃尔特斯浅滩陡峭，呈锥形，平顶（最小深度 15 米）覆盖有破碎和锯齿形的珊瑚礁，尤其是漫长的外边缘。确定的底部等深线为 800 米。它们是最近提到的大螯虾十足目龙虾已知的唯一栖息地，沃尔特斯浅滩浅水鱼类区系的 30% 至 40% 为岛屿和海山西风链某些地方所独有。	H	M	L	L	L	M	H
23. 珊瑚海山和断裂带特征 • 位置：南纬 41°00'-41°40' 和东经 42°10' - 43°10" 之间。	H	M	-	H	-	H	M

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 该地区是亚南极水域已知的唯一冷水珊瑚礁栖息地。这是在西南印度洋的一个独特区域，其中包括大片陡峭的地形，从 300 米深的珊瑚海底山的海底山山顶一直延伸到 5,200 米水深处相邻的深海海沟/断裂带特征区域的底部，距海底山西部只有 10 公里。该地区是冷水珊瑚礁和珊瑚园，包括石珊瑚目和八放珊瑚亚纲的栖息地。这里是各种相关动物群，包括各种无柄（珊瑚、海绵）和移动（东方扁虾、棘皮动物）的聚集区。此外，与海底山相关的浮游生态系统不同于曾研究过的亚南极锋以北的海底山。特别是，珊瑚海底山生活着数量众多的浮游长尾长尾鳕科鱼。 							
24. 莫桑比克海峡北部 <ul style="list-style-type: none"> 位置：姆特瓦拉南部到坦桑尼亚南部；莫桑比克北部、马达加斯加西北部和东北部、科摩罗群岛、塞舌尔南部，包括阿尔达布拉群岛、普罗维登斯高原和法夸尔以及法国海外领土马约特岛和格洛里厄斯群岛。 莫桑比克海峡北部可作为一个同质的生态生物地理单元，其特征是环流和涡旋波涛汹涌，促进岛屿彼此紧密相连。同这些涡流和环流运动有关的涌流模式导致最丰富的生物多样性集中在该区域的这一地区。 	H	H	H	H	H	H	L
25. 莫埃利海洋公园 <ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 11°20'-13°04'和东经 43°11- 45°19'。 作为国际自然及自然资源保护联盟第六类公园，莫埃利海洋公园是区域和国际层面具有代表性的许多物种和生态系统的栖息地。莫埃利海洋公园是这个群岛的绿海龟的第一个筑巢地，是座头鲸的重要繁殖区和儒艮的避难所。 	M	H	H	H	H	H	H
26. 爱德华王子岛、德尔卡诺海隆和克罗泽群岛 <ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 43°-48°和东经 32.73°-55°。 	H	H	H	H	H	H	H

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 它是许多濒危鸟类的觅食和繁殖区，对陆海连通和海洋生物分布特征之间的联系非常重要。这里有相当大的浮游和底栖生境异质性，其中可能有敏感的生境和脆弱的物种，包括暗礁形成的冷水珊瑚。这个区域的生境包括海底山、转换断层和海底破裂带、深壕、热液喷口、深海平原和若干深海栖息地。 							
27. 马达加斯加岛南部（莫桑比克海峡的一部分） <ul style="list-style-type: none"> 位置：水深 1,000 至 2,500 米的大片深海底高原或山脊，从马达加斯加南向南延伸至近 1,000 公里的距离。 该地区食物丰富的水域是该地区迁徙频繁的物种，包括海鸟和鲸类动物的重要觅食地。这里有大型海岸沙丘、泻湖和海边养殖池，形成了独特的沿海生境和湿地。这个区域的浅层底栖生物群落主要是硬质沉积群落，四周有小型孤立的珊瑚礁。 	H	H	H	M	H	H	H
28. 特罗姆林岛 <ul style="list-style-type: none"> 位置：大约在留尼旺岛西北部 580 公里（东经 54°31'，南纬 15°53'）。 由于不易接近，科学知识不多，针对的是极少数类群。自 1980 年代一直对海龟进行监控，长期分析表明，特罗姆林岛是绿海龟在西印度洋最重要的筑巢区之一。已在该区域的珊瑚和鸟类中发现遗传隔离现象，这也使这个海岛具有非常的保护意义。此外，该地区是本区域两类稀有的 Faviid 珊瑚的栖息地。 	H	H	H	H	H	H	H
29. 马赫岛、阿尔丰斯和阿米兰特高原 <ul style="list-style-type: none"> 位置：东经 50°00' 至东经 58°00' 和 0°00' 至南纬 10°00' 之间。 这里生物多样性非常丰富，是鲸类动物的繁殖、觅食和育苗区，并为这些物种提供了迁徙路线，是上层鱼类，尤其是金枪鱼和鲨鱼物种的重要觅食地。珊瑚礁和红树林是这一区域的特色，为鱼类产卵和饲养提供了重要场所，而红树林帮助减少沉降和珊瑚礁的流 	H	H	H	M	H	H	L

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
失。高原提供繁殖和觅食地，帮助保护海鸟。这里是绿海龟和玳瑁的重要筑巢地。							
30. 亚特兰蒂斯海底山 <ul style="list-style-type: none">位置：约在南纬 32°38'-32°48'和东经 57°12'-57°20'之间。一个活动构造的海山/平顶海山/沉没的岛屿，地貌复杂，这一地区深度为 700-4,000 米，生活着各种各样的深海动物群。海底山有各种珊瑚园和复杂的海崖深海群落，其代表是大海葵、扶手椅大小的海绵和八放珊瑚。海底山生活着大洋拟五棘鲷和金眼鲷。	H	M	H	H	M	H	M
31. 蓝湾海洋公园 <ul style="list-style-type: none">位置：蓝湾海岸公园位于毛里求斯东南部，从北部的 Corps de Garde 港延伸到南部的瓦科阿岛。在公园里找到两种类型的珊瑚礁：裙礁和补丁礁。这里有非常丰富的珊瑚物种，至少有 28 属、15 科的 38 种不同的物种。目前公园里有商业物种和许多岩礁鱼类，包括那些有驯养行为的物种，以及其他海洋动物，包括 7 种棘皮动物、8 种软体动物、4 种甲壳类、4 种海绵、2 种裸鳃类动物、4 种海参和 1 种海龟。	H	H	M	H	-	H	H
32. 撒雅德玛哈浅滩 <ul style="list-style-type: none">位置：南纬 8°30 - 12°和东经 59°30 - 62.30°之间。撒雅德玛哈浅滩是构成马斯克林高原的三个浅滩中最大的一个浅滩。马斯克林高原非常遥远，仅在最南端有露出水面的土地和小岛，这个高原还没有全球知名度，或对其进行充分研究，但大量迹象显示这里有独特的海洋学特征和生境，其中包括世界上最大的海草床和浅水生境、特有物种和大量聚集的海洋哺乳动物和海鸟。	H	H	-	-	H	-	H

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
33. 斯里兰卡一侧的马纳尔湾	H	H	H	H	H	H	L
<ul style="list-style-type: none"> 位置：斯里兰卡一侧的马纳尔湾。这个区域坐落在斯里兰卡的专属经济区和大陆架范围内。该地区符合具有重要的生态或生物意义海洋区域的标准，位于与西北部和北部的海岸线相接的沿海水域。面向陆地的一侧连接海岸线，并从海岸线延伸 5 公里到大海。 这一地区有丰富的生态和生物多样性，是海龟和儒艮的一些濒危物种的栖息地。此外，该地区拥有非常脆弱敏感的沿海生态系统—珊瑚礁、海草床、红树林边的泻湖和河口、泥滩、沙丘和一些河口的入口。在全球范围内，可在本地区找到濒临灭绝的海洋哺乳动物，如蓝鲸和大公儒艮。本区域生物多样性丰富，有鳍鱼、鲨鱼、鳐鱼、虾、龙虾、琵琶虾、海螺、海参和岩礁鱼。传统上重要的天然珍珠床也在那里。 							
34. 印度洋中部盆地	L	H	M	L	L	M	-
<ul style="list-style-type: none"> 位置：该区域位于斯里兰卡南部和东部、马尔代夫、印度洋中部海盆和东经九十度洋脊的一部分。 这个区域非常出名，是在西印度洋筑巢的至少四种海鸟的重要觅食地，在南部的冬季期间，鸟儿在季节性浮游生物大量繁殖期间迁徙 3,000 多公里到这里觅食。 							
35. Rusky	H	-	-	H	-	-	L
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 31°20' 和东经 94°55'- 南纬 31°20' 和东经 95°00'、南纬 31°30' 和东经 95°00'- 南纬 31°30' 和东经 94°55'。 在断脊中部东经 95° 出现的一个小山丘，从山脊的海底基地不断上升，从 1,200 米上升到 580 米。这是山脊中央的唯一一个山丘。在山丘上发现了小金眼鲷和伪五棘帆属。已在山丘上进行过拖网捕鱼作业，在捕获量中发现了黑珊瑚（刺胞动物）。这是断脊上已知有黑珊瑚的唯一地区，南印度洋深海捕鱼者协会已宣布该地区为底栖生物保护区。 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
36. 福尔斯平地	H	-	-	H	-	-	H
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 31° 32' 和东经 94° 40'- 南纬 32° 和东经 95° 32'、南纬 31° 50' 和东经 95° 38'- 南纬 31° 24' 和东经 94° 51'。 这一地区位于断垄高原南侧。山脊浅滩中心区域到周围大约 990 米，其南侧急剧下降到 4,000 米。山脊的南部边缘有大量冷水珊瑚，高度为 20-30 米，并借助侧扫声纳进行了研究。西南边界似乎有强大的上升流，这无疑为深水珊瑚的生长创造了有利条件。主框架建筑物种似乎是 <i>Solenosmilia variabilis</i>。该框架主要由死珊瑚组成。 							
37. 盖奥特东断脊	H	-	-	M	-	-	H
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 32° 50' 和东经 100° 50'- 南纬 32° 50' 和东经 101° 40'，南纬 33° 25' 和东经 101° 40'- 南纬 33° 25' 和东经 100° 50'。 这个平顶山测深高，还是一个局部比重高的区域，位于断脊的东端。深度从 3,000 上升至 1,060 米。深水将这里从断脊分离开来，是约东经 100° 北部至南纬 28° 北部之间系列最南端和最浅的一系列最南部和最浅的地方之一。重测量高点在深海（4,000-5,000 米）中距离海底 1,500-200 米的平顶山上。它的特点有两侧有无数的滑坡和峡谷，并且似乎侵蚀严重。就目前所知之前未对其进行过描述，也没有在这里进行过拖网行为。认为这里在生物学上是纯净的，并且还没有描述过其海底生物和高度断裂的地形。一些迹象表明，过去某一段时间这里曾高于海平面。这个平顶山的结构同断脊其他地方的结构迥然不同。它的结构长而窄，西侧的地貌复杂，为深水所环绕。 							
38. 爪哇岛南部	M	H	H	-	H	-	-
<ul style="list-style-type: none"> 位置：南纬 12-17° 和东经 107-117° 之间。 这一地区是南部蓝鳍金枪鱼已知的唯一产卵区。南部蓝鳍金枪鱼的种群单一，广泛分布在南半球。该物种返回爪哇岛南部地区产卵。产卵发生在 9 月至次年 4 月，未少年的南 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
部蓝鳍金枪鱼向澳大利亚西海岸迁移，分散在整个印度洋、太平洋和大西洋。							
39. 大澳大利亚湾南部 <ul style="list-style-type: none">• 位置：位于南澳大利亚的中央海岸。• 这里是全球几种濒危的海鸟和鱼的重要觅食区。所涵盖的具体生活史阶段包括非繁殖季节来自阿姆斯特丹岛的乌信天翁和来自克罗泽岛的未成年漂泊信天翁。这里还被用于迁移极度濒危的南部蓝鳍金枪鱼。	-	H	H	M	L	-	-

表 2. 对热带和温带太平洋东部地区符合具有生态或生物重要性的海域标准的区域的描述

(详细内容载于《促进描述具有重要生态或生物意义的海洋区域 (EBSAs) 的热带和温带太平洋东部区域讲习班》的附件四的附录, UNEP/CBD/RW/EBSA/ETTP/1/4)。

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
1. 东北太平洋白鲨海洋聚集区 • 位置: 大约北纬 23.37°、西经 132.71°, 半径约为 250 公里的地区。 • 它是本次讲习班界定的地理边界西北角东北太平洋海洋水域中成年大白鲨 (大白鲨) 的季节性聚集区。鲨鱼来自两个沿海越冬区 (美国加利福尼亚中部和墨西哥瓜达卢普岛) 和夏威夷。鲨鱼一年数月在持久性和可预测的区域聚集, 这对于这个群体非常重要, 即使在聚集发生的区域中, 不知道是否会出现动态海洋学过程, 且表层初级生产力低下。	H	H	H	L	L	-	-
2. 克利珀顿环礁 • 位置: 克利珀顿岛 (北纬 10°17', 西经 109°12') 位于加利福尼亚州半岛顶端和赤道之间。该地区的界限是根据哺乳类动物蓝脸鲣鸟的觅食区划定的, 觅食区位于岛屿 200 公里内。 • 这是热带太平洋东部的唯一环礁, 由于这个原因, 它代表了这个区域中特定和独特的生态系统。距墨西哥海岸 1,000 多公里, 它是从西部迁徙涌入的前哨, 但对于幼虫分布范围不大的许多海洋物种而言, 这里有点孤立。这里的特有现象是有几个主要类群, 如鱼 (5%), 或甲壳类 (6%)。环礁似乎的确被鲨鱼, 至少是被白鳍鲨用作繁殖地, 世界自然保护联盟将白鳍鲨划入近危物种类别。在全球范围内, 这里的蓝脸鲣鸟数量众多, 有资格成为禽鸟生命国际组织标准规定的鸟类重点保护区。据估计这里大约有 110,000 只鸟, 其中 20,000 对在繁殖, 这使其成为世界上这一物种的最大栖息地。此区域的界限是根据这个物种的觅食范围划定的。	H	H	M	M	M	M	

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
3. 瓜伊马斯盆地热液喷口保护区 <ul style="list-style-type: none">位置：这个区域的坐标为最高北纬 27°05'49.54"-最低北纬 26°57'20.43"; 最大西经 111°27'53.01"-最小西经 111°19'24.88"。以水柱计和海底在水下 500 米。加利福尼亚湾的瓜伊马斯盆地是一个受热液影响、半封闭的盆地，其中氧化和氧化物的沉淀尤为强烈。由于其靠近海岸，这是一个不寻常的热液系统，那里的高沉积速率在脊轴上形成了大片厚厚的有机化合物丰富的沉积物。它有一个独特的底栖物种结构。瓜伊马斯盆地热液沉积物中含有高度多样化的厌氧嗜热微生物，包括产甲烷菌、硫酸盐还原菌以及可能还有甲烷氧化菌。	H	H	M	M	H	H	M
4. 危地马拉 Sipacate-Cañón 圣何塞海洋生态系统 <ul style="list-style-type: none">位置：危地马拉圣何塞的 Sipacate-Cañón 海洋沿海区位于危地马拉领海范围内的太平洋东部。Sipacate-Cañón 已被作为一个重点区域纳入危地马拉国家保护区系统。该区域有一个海洋沿海地区，受茂密的红树林和河口泻湖的影响，对具有商业重要性的鱼类和海龟、远洋鸟类和鲸类动物等海洋物种的生命周期非常重要。	M	H	H	M	H	H	M
5. 丰塞卡湾 <ul style="list-style-type: none">位置：丰塞卡湾横跨中美洲与太平洋相关的水域约 2,015 平方公里。它毗邻三个国家：萨尔瓦多、洪都拉斯和尼加拉瓜。几个汇合的河流为这个水体带来营养物质、污染物和泥沙。该海湾由不同的生态系统组成，其中主要生态系统包括丰塞卡湾的红树林、干燥热带森林、潮间带平原、潮间带和潮下岩石区。几条在此交汇的河流为这块水域带来丰富的营养、污染物和沉淀物。这个海湾还包含不同的岛屿，其中有一些大大高于水平面 (>500 米)。这一地区是重要的传统捕鱼和贝类水生动物捕捞区。盐业生产和虾类养	H	M	M	H	-	M	M

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
殖也发生在该地区。							
6. 马尔佩洛海岭	H	H	H	M	M	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 位置：根据研究划定区域的坐标为北纬$1^{\circ}29'24''$ - $5^{\circ}0'02''$和西经$79^{\circ}40'26''$-$82^{\circ}44'56''$。马尔佩洛海岭完全在哥伦比亚太平洋海洋盆中心区的国家管辖范围内。 它自东北向西南延伸，跨度为长240公里，宽80公里。东侧从大约4,000米的深度急剧上升。这个区域是特有物种的栖息地，具有丰富的生物多样性。不同种类的海洋哺乳动物和鲨鱼在其各自的部分生命周期生活在这个区域。由于本区域内的渔业资源被过度开发且受到厄尔尼诺现象的影响，这个区域的生态系统极其脆弱。 							
7. 东部太平洋热带地区的热穹窿	H	H	H	H	H	-	-
<ul style="list-style-type: none"> 位置：全年的大小和位置不同，但平均位置约在北纬9°、西经90°，在北赤道流西部和北赤道逆流东部之间。 东北部太平洋地区的初级生产力非常高，生活着海洋食肉动物如金枪鱼、海豚和鲸类动物。濒危棱皮龟，它们在穿过这片区域，在哥斯达黎加的海滩筑巢。该地区是濒临灭绝的蓝鲸一年生存和恢复的重要栖息地。该地区是蓝鲸特别重要的生活区，冬季期间蓝鲸从加利福尼亚半岛向南迁徙以便繁殖、产仔和喂养。 							
8. 东部太平洋热带地区海洋走廊	M	H	H	M	M	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 位置：东部太平洋地区中央。 属于这一地区的四个国家（哥斯达黎加、哥伦比亚、厄瓜多尔和巴拿马）已认识到这一地区生物多样性的重要性，已宣布这些地区为联合国教科文组织世界遗产。科学证据表明，该地区的地貌结构具有重要的生物和生态意义，对物种迁徙路线和生命周期（例如，交配、出生、喂养等）的联系非常重要。该地区对锤头双髻鲨、座头鲸、棱 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
皮龟和榄蠵龟以及鸬鹚、鲣鸟和鹈鹕等鸟类的种群非常重要。							
9. 赤道高生产力区							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该开阔洋系统大约介于赤道两侧的北纬 5°和南纬 5°之间，西起加拉帕戈斯群岛，东至东经约 165°。 太平洋赤道高生产力区为规模较大的赤道流系海洋地貌。它几乎横跨整个太平洋盆地，但南北方向狭窄，在赤道两侧呈带状分布。该区域的温跃层在风力的作用下，自西向东流动，将高浓度的营养物质带至表层附近，使得该区域的初级生产力高于南北两侧的附近海域。该水域底栖水层耦合性强，深海平原的底栖次级生产力与表层初级生产力密切相关。根据记载，该地区的抹香鲸数量曾创下历史较高水平。该地貌深受厄尔尼诺现象的影响，且易受气候变化的影响。另外，气候变化也可能削弱本区域支持其高水平初级生产力的上升流和营养循环。 	H	L	L	-	H	L	L
10. 加拉帕戈斯群岛及其西向延伸地带							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：这一地区占地 585,914 平方公里，其地理坐标为：西经 95.2477°；北纬 3.6744 °；西经 87.2051°；南纬 3.4350°。 加拉帕戈斯群岛生态系统拥有丰富多样的特有物种，现已建立加拉帕戈斯群岛海洋保护区，对这些物种进行保护。加拉帕戈斯生态系统的物种极其丰富多样，分布在不同的海洋生物栖息地，这不仅反映了该群岛的地质情况和多样化的海洋性特征，还反映出该群岛的年内和年际变率之高。关于该群岛其他物种（例如，鲨鱼、鲸鱼、马林鱼、信天翁）的各类研究表明，本区域内的很多物种存在持续性迁徙模式。在迁徙过程中，个体很容易与工业渔业产生交汇，并与行进中的大型船舶发生碰撞。该地区，新的物种一直在不断出现（3464 种海洋无脊椎动物，684 种鱼类；种类仍在继续扩大），这表明，该海域就其物种多样性和地方特殊性而言极具重要性；该地区还是热带东太平洋海域生物地理特征的典型代表。该地区物种的高度多样性源自其高水平的 	H	H	H	H	H	H	M

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
初级生产力，这不仅是加拉帕戈斯群岛海洋保护区的一大特征（因为“岛屿效应”），也是海山、平台斜坡、深海平原和海底热液系统等沿海以外栖息地的一个普遍特点。							
11. 卡内基海岭-赤道锋							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：卡内基海岭西起厄瓜多尔和秘鲁西海岸，南至南纬 1°和南纬 6°，东抵西经 88°。 该区域包括厄瓜多尔领海（大陆和岛屿）、国际水域和秘鲁领海；还包括各类非常重要的结构。赤道锋是厄尔尼诺和洪堡流输送的水团之间的过渡区，其特点是温盐梯度大，并在旱季达到峰值（南纬 1°为 24°C–33.5ppt；南纬 2 和 3°之间为 18°C–35ppt）。赤道锋南侧的生物生产力水平历来较高。卡内基海岭是位于厄瓜多尔海岸和加拉帕戈斯群岛之间的太平洋火山无震洋脊。热带东太平洋的最南端是生物多样性丰富区，栖息着秘鲁沿海地带 70% 以上的物种。热带东太平洋生物地理省拥有众多特有物种，多类物种数量居最。这是红树林分布的最南端，生物群落结构独特。这里是大型鲸类的繁衍之地，是海龟繁殖范围的最南端。该地区生活着许多受到威胁或遭到过度开发的物种。该地区生产力水平高，因为它能够获得来自洪堡生态区的营养物质。 	H	H	H	M	H	H	M
12. 瓜亚基尔湾							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：海湾口沿西经 81° 子午线自北向南绵延 200 公里，从厄瓜多尔蓬蒂亚德圣埃伦娜（南纬 2°12'）延伸至秘鲁曼科拉（南纬 4°07'）附近。海湾伸入内陆约 120 公里。 瓜亚基尔湾是东太平洋南美洲海岸线上最大的河口。海湾向内陆延伸约 120 公里。瓜亚基尔湾自然分为外口（起始点为普纳岛西侧（西经 80°15'））和内口（自普纳岛西端向东北延伸），包括特罗萨拉多和瓜亚斯河水系。该湾生物生产力水平高，栖息着丰富多样的生物群并支撑着该国最重要的渔业，河口周边红树林遍布，汇入该湾的河流带来大量的有机物质沉积，同时又受到各种水团的影响，占据主导地位的河口条件与 	H	H	H	H	H	H	L

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
海洋和河流特点相结合，内部平台面积广阔且深度较浅，加之许多其他因素，故而明显有别于该区域其他类似环境。瓜亚基尔湾的海洋条件与赤道锋的发展、沿海上升流和各种水体（海水和来自海湾内河口的淡水等）相互作用密不可分，而这也正是该海湾浮游植物丰富多样的重要成因。							
13. 秘鲁洪堡上升流系统	H	H	H	L	H	H	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该区域位于洪堡洋流生态系统的海岸带，与秘鲁中部海岸相对，介于南纬 5° 和 18° 之间。其最西端为大陆坡外界的海岸线，等深线约为 5,000 米。 秘鲁沿岸洪堡洋流生态系统是世界上最具生产力的海域之一。它与沿海海洋上升流活动系统相连，该系统因其地方特殊性强而独一无二。这些区域通常含有数目庞大的小型中上层鱼类（凤尾鱼和沙丁鱼），它们反过来又为大量掠食性动物提供食物来源并维系着捕鱼活动的发展。该区域有七股相当强大的上升流，这对于该系统在经历高气候变率现象后的重建至关重要。此外，该地区的生物多样性之高具有世界性意义，并且已被列为全世界 200 个重点保护的生态区之一。 							
14. 秘鲁洪堡上升流系统的持续上升流核心和重要鸟区	H	H	H	L	H	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：现已查明，在这几处生物活动中心存在六股洋流，剧烈的海风与千姿百态的沿海暗礁相撞击，形成最重要的洪堡洋流上升流中心。这些中心是：1) 蓬阿古哈（南纬 5°47'）；2) 钦博特（南纬 9°5'）；3) 卡亚俄（南纬 12°59'）；4) 帕拉卡斯（南纬 13°45'）；5) 蓬圣胡安（南纬 15°22'）；6) 蓬智迈（南纬 16°14'）。 秘鲁生态系统的上升流主要是在海岸平行风的作用下形成的，并受到温跃层深度、沿海形态和海底地形等其他因素的高度影响。这在秘鲁海岸形成一系列的上升流中心，而这正是海洋掠食性动物在此聚集的重要原因，同样，这里还成为世界上最密集的海鸟聚集区：排粪鸟类聚集区。这些中心对于出现变暖现象之后洪堡系统的重建至关重 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
要，而且，在出现变暖现象期间，这些中心内的上升流持续不停，遂而成为避难所。							
15. 智利北部洪堡上升流系统	H	H	M	H	H	M	-
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于南纬 21° 和 24° 之间的智利北部上升流区，自海岸线向海上延伸 200 公里。 这个上升流区包括萨尔瓦多罗亚河区、梅希约内斯半岛沿海上升流中心及周边地区。在上升流的驱动下，萨尔瓦多罗亚河区和梅希约内斯半岛都是生物活动极为活跃的知名地带，这里浮游和底栖生物群落集中，从而成为鱼类、甲壳类和软体动物物种的重要产卵及哺育区。连续不断的上升流带来大量养料，种类庞杂的浮游植物蓬勃发展但它们生命周期极短，为后续营养级向更高水平的多样性进化提供了机会。 							
16. 智利中部洪堡上升流系统	H	H	H	-	H	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该区域位于南纬 29 和 31° 之间，并向西延伸 200 公里。 该区域包括位于其南部边界的一个重要的受风力吹动形成的上升流中心、四个大小和海岸方向各不相同的海湾共同构成的一个较大的海湾、几个大小各异的岛屿和几座海山，以及其北部边界受地形和洋流作用形成的一个上升流中心。由于上升流一年四季不息，该系统生产力水平极高，该地区的海湾为几个物种提供了休养生息之所。该地区分布有几个常住濒危鸟类和海洋哺乳动物栖息地。 							
17. 智利南部洪堡上升流系统	H	H	-	H	H	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：这一海域位于智利中南部南纬 35° 和 38° 之间的区域，并自海岸线延伸至海上 200 公里处。 此区域表现出极高的初级生产力价值，其特点是上升流季节性强，在南半球春、夏两季，上升流现象沿着一条被海底峡谷隔断的相对较宽的大陆架 (>50 公里) 频频出现。 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
在该大陆架上，长时间缺氧对底栖环境产生影响，促进大量生物质以巨型细菌瓣硫菌属垫的形式生长。这个生态系统的高生产力水平表明，厄尔尼诺/南方涛动周期年际变率很高，造成源自该生态系统的资源可持续性和该生态系统对正在发生的气候变化的潜在应对具有不确定性。							
18. 萨拉•戈麦斯和纳斯卡海岭	L	H	H	H	M	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：萨拉•戈麦斯海岭的地理坐标为南纬 23°42'、南纬 29°12'、西经 111°30' 和西经 86°30'。纳斯卡海岭的地理坐标为南纬 15°00'、南纬 26°09'、西经 86°30' 和西经 76°06'。 该地区是一个生物学热点地区，其海洋生物物种特有性居世界前列（鱼类 41.2%，无脊椎动物 46.3%）。它被视为某些海洋哺乳动物（如蓝鲸）的必经之地，而且，现已被确定为棱皮龟觅食区的一部分。此外，它已被称为旗鱼的休养生息和哺育区，还被描述为过度开发物种智利竹荚鱼繁殖场所的一部分。 							
19. 侏恩费南迪储海岭的海山	H	H	M	M	M	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该区域与智利大陆和岛屿专属经济区相对应，其中有海山。该区域分为七个区：北部区、中部区、南部区、远南区、圣费利克斯区、侏恩费南迪储区和复活节岛。 智利各类专属经济区内现已查明和描述的海山共计 118 座。此外，现已收集到关于侏恩费南迪储 1 号和 2 号海山 (JF1、JF2) 的海洋和生物数据（浮游植物、浮游动物、无脊椎动物，以及使用各种技术的探捕）。历史资料表明，在 JF1 和 JF2，曾有 82 个物种被捕获；值得注意的是，黑珊瑚已经陷入龙虾陷阱。JF1 和 JF2 的水下照片显示，它们明显带有受海底拖网和疏浚影响而形成的特征。捕鱼作业主要发生在 JF2 海山。2002 年、2003 年和 2005 年，捕鱼作业量大幅增加，改变了 JF2 海山资源聚合的空间结 							

海域的地理位置及概述	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
构。							
20. 西风漂流交汇处							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：位于智利海岸南纬 41.5°和 47°之间（包括峡湾和海峡，以及距离直线基线 100 海里内的近海区域）。它还通过超深海渊带延伸，将远洋区域包括在内。 这一拟划定的区域由一群纵横交错的内海、群岛、海峡和峡湾组成，直线距离绵延约 600 公里，环绕着大致 10,700 公里的蜿蜒曲折的受保护海岸线。这个区域（又称“咆哮西风带”的一部分）现已被列为确定拉丁美洲和加勒比地区海洋保护地理优先事项过程中的一个“重大关切”。该海域的部分地区属于寒温带南美省，也被称为智利生态区。 	H	H	M	M	H	H	M
21. 东南太平洋海隆灰色海燕喂养区							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该区域的地理坐标大致如下：北纬 120°，西经 47°；北纬 112°，东经 49°；南纬 112°，东经 57°；南纬 120°，西经 57°。该地区毗邻东太平洋海隆最南端，南太平洋盆地西部。最近的陆地在南距南极洲 2,000 公里，北距复活岛 2,500 公里，东距南美洲 4,000 公里，西距新西兰岛屿 7,000 公里。 该地是新西兰映岛近危物种灰色海燕（灰风鹱）在非繁殖季节的一个主要觅食区。每年 10 月至来年 2 月期间，这些鸟类从繁殖地迁徙至此地觅食。该地区地处东太平洋海隆最南端附近，南太平洋盆地西部。国际鸟盟承认，该地区是一个重要鸟区。一个栖息地利用推进式回归树，分析非繁殖期灰色海燕的跟踪数据，发现水深、混合层的深度、表层和水下 50 米之间的平均温度、叶绿素 a 浓度和流速都影响着鸟类的分布。 	M	H	M	M	-	-	-

表 3. 对北太平洋地区符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的区域的描述

(详细内容载于《促进描述具有重要生态或生物意义的海洋区域 (EBSAs) 的北太平洋区域讲习班报告》附件五的附录,
UNEP/CBD/EBSA/NP/1/4)。

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
1.彼得大帝湾 <ul style="list-style-type: none">• 地理位置：该地区位于俄罗斯领海的最南端。彼得大帝湾包括三个小海湾：阿穆尔湾、乌苏里湾和普斯艾塔湾。• 该地区的特点是北部和亚热带动物群汇聚共存，生物多样性高度丰富。该地常见的底栖动物包括各类牡蛎和扇贝。该地区生长着大量茂盛的海带、鳗草（大叶藻属）、伊谷草和江蓠。商业性鱼类包括阿拉斯加鳕鱼、石斑鱼和沙丁鱼。商业性底栖无脊椎动物包括堪察加蟹属、雪蟹属（灰眼雪蟹）、浪蛤属和马珂蛤属等物种，以及灰色和黑色海胆和列入濒危名录的腹足类。该地还是一个觅食区，经常有鲨鱼在此出没。在该海域和岛屿上，栖息着 350 多种鸟类，其中有 200 种与海洋存在联系。该地区是东亚-澳大拉西亚迁徙路线上的主要驿站之一。	H	H	H	H	H	H	M
2.西堪察加大陆架 <ul style="list-style-type: none">• 地理位置：本区位于鄂霍次克海东部，北太平洋堪察加半岛西部海岸线(俄罗斯联邦)：北至平行于 200 米等深线的北纬 57°15'，南至平行于 200 米等深线的北纬 50°51'，西起东经 156°39'，向东一直延伸至东开普沃帕特卡。• 这里是各种太平洋鲑鱼的一个主要觅食区和产卵前洄游的必经之路。西堪察加大陆架是螃蟹、阿拉斯加狭鳕、鲱鱼、鳕鱼和大比目鱼等物种的重要繁殖区。该地区在支撑整个鄂霍次克海域的生产力和生物多样性方面发挥着独特的作用。该区域分布有世界上最大的红鲑鱼（红大麻哈鱼）天然产卵场。	M	H	H	M	H	H	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
3.堪察加半岛东南沿海水域	-	H	H	M	M	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域的边界始于海角沃帕特卡（堪察加半岛的南端，北纬 50° 90，东经 156° 70），沿俄罗斯联邦领海外缘向北延伸，直至海角科兹洛娃（北纬 54° 65，东经 161° 89）。 堪察加半岛东南沿海水域对于几种海洋巨型动物至关重要。俄罗斯远东地区的海岸线普遍较为平直。它撑托起这片狭小水域的高度生物多样性，并吸引着海洋巨型动物（鲸目动物、鳍足类）来此生息繁衍。多种不同的脊椎动物（海洋鸟类、鲸类、鳍足类、鲑鱼类）都沿海岸进行迁徙。 							
4.库页岛东部大陆架	M	H	H	M	H	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该地区沿库页岛东海岸分布，南起库页岛南端，沿 200 米等深线向北延伸，东至阿穆尔河河口。 该地区底栖生物聚集区密布，是灰鲸的一个重要捕食区。世界上数量最少的鲸鱼种群就依赖其福利为生（鄂霍次克-韩国灰鲸）。底层生物群落的特点是贝类和海胆密度高。库页岛北部地区是鲑鱼大规模向阿穆尔河的产卵地洄游的必经之地，因而是白鲸的一大觅食地。该地区还发现了极具商业价值的鲑鱼（大麻哈鱼）。濒危鲟鱼（鳇）、成群绵蟹和列入濒危名录的萨哈林哲罗鲑也经常出没于这片海域。 							
5.莫涅龙岛岛架	M	M	-	L	H	L	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：莫涅龙岛（北纬 46°14'00"，东经 141°13'00"）位于鞑靼海峡，俄罗斯联邦库页岛西南方向 45 公里处，其岛架边界沿 150 米等深线分布。 这里是一个生物多样性热点地区，底栖生物群落多样性高度丰富，海洋生态系统完整，其中包括海绵、苔藓虫、红水螅珊瑚动物群落。该地区位于鲍鱼分布带的北部边界地带，因受自然因素影响，年际变率高。该区域是鄂霍次克海南部地区唯一的一处斯特勒 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
海狮群栖地，也是鄂霍次克海中浮游动物密度最高的区域。							
6.尚塔尔群岛岛架、阿穆尔湾和图古尔湾	H	M	H	H	H	H	H
<ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：该地区位于鄂霍次克海东南部，覆盖整个尚塔尔群岛，其边界延伸至俄罗斯联邦尚塔尔群岛周边 30 海里处。 • 该地区的植物群和动物群及其非生物景观都带有很多地方特有性。群岛上有很多地方特有性。群岛上多个鳍足类动物大型群栖地，而且附近海域的鲸鱼数量也在稳步攀升。鸟类多样性极高，240 多个物种（包括世界自然保护联盟濒危名录所列物种）将该区域作为筑巢和移徙地。图古尔湾的生物质约达 100,000 吨之多，由海绵、海葵、海鞘、海藤壶和双壳类组成。 							
7.指挥官群岛（科曼多尔群岛）架和岛坡	H	H	H	H	H	H	M
<ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：指挥官群岛（科曼多尔群岛）位于西白令海和太平洋的地理边界线上，其中包括两个大岛（白令岛和梅德内岛）、两个较小的岛屿（托波尔科夫岛和阿雷罗克岛）和散落在阿留申群岛延伸线上的零星岩石。该区域包括深达 4000 米的岛架和岛坡及各自的水层，完全属俄罗斯联邦管辖范围。 • 本区域带有显著的独特性，其海洋生物多样性水平之高至今尚未有完整记录。它对于维持多个重要海洋物种的数量具有重要意义，在保护濒危和受威胁物种方面也起着至关重要的作用。该区域，特别是近海区域，仍高度保持着原始的自然本色。该地区虽敏感性高，但受保护的历史由来已久。然而，进一步记录海洋生物多样性和监测海洋生态系统的所有重要层面是管理该区域和支持整个北太平洋地区养护努力的关键所在。 							
8.楚科奇半岛东部和南部海岸	M	H	H	H	M	H	H
<ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：该区域从阿纳德尔湾西北海域的克列斯特湾开始，沿楚科奇半岛崎岖复杂的海岸线延伸，止于杰日尼奥夫角。海上边界恰与俄罗斯联邦白令海专属经济区的界限和 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
俄罗斯在白令海峡的海上边界线重合，因而完全处于俄罗斯的管辖范围之内。							
<ul style="list-style-type: none"> 白令海峡西部和楚科奇半岛南部沿海水域的独特性在于其面积最大和最广为人知的北太平洋和楚科奇海冰间湖体系。这里是北极露脊鲸、白鲸、太平洋海象和众多海鸟的越冬地。在春季，冰间湖被用来作为迁徙路线。在夏季，楚科奇半岛的南部和西南海岸成为楚科奇最大的海鸟繁殖地。该区域海岸线崎岖复杂和海冰情况变化多样，因此，作为一个北极地区而言，其沿岸和亚沿岸栖息地丰富多样，海洋物种多样性水平相对较高。 							
9.雅姆斯基群岛和舍利霍夫湾西部	M	H	H	H	H	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该区域位于俄罗斯专属经济区内，自鄂霍次克海西北海域位于 200 米等深线的扎维亚洛夫岛所在纬度以东开始，沿着环绕皮亚根半岛和科尼半岛和雅姆斯基群岛的等深线延伸分布，直至吉日加半岛，包括舍利霍夫湾西部。 舍利霍夫湾的特点是上升流往复运动、潮汐流强大和冰情特殊。其高水平的生产力吸引着众多物种出没于该区域，其中包括濒危物种。雅姆斯基群岛岛架区是鲸类不可或缺的重要区域，同时还是众多海鸟的栖息地。 							
10.阿利霍斯群岛	L	L	-	M	H	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：阿利霍斯群岛（墨西哥）地处太平洋东部海域（北纬 24° 57.5' 和西经 115° 45.0'），位于加利福尼亚半岛以西 300 公里处。 阿利霍斯群岛是一组圆柱状小火山岛，深度介于 2,400 米和 4,500 米之间。阿利霍斯群岛属于太平洋沿海生物群落，位于加利福尼亚洋流流域的南段，地处下加利福尼亚州西南的辐合锋西北方向。受上升流影响，该区域生产力水平高，在此撑托下，鱼类和其他脊椎动物密度高。阿利霍斯群岛的特点是大批鸟类聚集于此。岩石露头是海鸟的主要筑巢地。这些岛屿被视为墨西哥的海洋保护优先地区之一。由于该区域地处偏远，仅极小一部分为外界所知，其自然本色得以一直保留至今，可是，现有知识和可用的生物、环 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
境和海洋数据有限。							
11.科罗纳多群岛							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置: 科罗纳多群岛位于北美大陆边缘，离下加利福尼亚半岛西北海岸 13.6 公里，在墨西哥专属经济区内。它是一个群岛，由四个小岛组成： <ul style="list-style-type: none"> 北科罗纳多岛（北纬 32°28'，西经 117°18'），占地面积为 48 公顷； 皮隆岩（北纬 32° 25'，西经 117°16'），占地 7 公顷； 中科罗纳多岛（北纬 32°25'，西经 117°16'），占地 14 公顷； 南科罗纳多岛（北纬 32°25'，西经 117°15'），占地 183 公顷； 群岛的四个岛屿支撑着丰富的鸟类种群。岛屿四周环绕着狭窄的大陆架。岛屿沿海地带包括海滩、悬崖、沙丘、沿海泻湖和海湾，形成深海栖息地。栖息地的多样性造就岛屿的高度生物多样性。在上升流的作用下，该区域的季节性初级生产力提高，支撑着高生物量的无脊椎动物、成批聚集的鱼类、海洋鸟类和哺乳动物。 	L	M	L	M	H	H	L
12.瓜达卢佩岛							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置: 瓜达卢佩岛是火山喷发形成的大洋岛，地处墨西哥专属经济区内，下加利福尼亚半岛以西 241 公里处。该岛位于北纬 29°2' 和西经 118°16.6'。 瓜达卢佩岛坐落在太平洋板块上，岛上有两个盾状火山。该海洋系统在上升流的作用下，生产力水平高，支撑着数量庞大的特有海洋鸟类、无脊椎动物、鱼类和海洋哺乳动物。该地区对于某些鸟类和海洋哺乳动物物种的生命阶段具有高度重要性。该地区的一个重要方面是，它与沿加利福尼亚洋流系统分布的其他种群息息相关。该地有许多特有的陆地和海洋物种因食肉动物和害虫的侵入以及岛上资源的开发利用而面临危险。 	L	H	M	M	H	H	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
13. 加利福尼亚湾上游地区	H	H	H	M	H	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该地区处于墨西哥的国家管辖范围内。 科罗拉多河三角洲和加利福尼亚湾上游地区有着当地独有的生物物理特性、特有生物物种和海洋学特征。其中包括潮汐运动形成强大的潮混合现象，以及科罗拉多河河水释放令淡水大量涌入三角洲地区。这里经过长期的泥沙沉积，形成巨大沙床，养料聚集，生产力极高。该地区还生活着一些濒危特有物种，其中包括加利福尼亚湾海豚和石首鱼。该地区对于长须鲸、普通海豚、海狮和众多海鸟而言亦十分重要。该地区的商业性渔业，无论是工业化还是小规模的渔业，都使该地区容易受到人类活动的影响。 							
14. 米德列夫群岛地区	H	H	H	H	H	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：米德列夫群岛地处墨西哥国家管辖范围内。 加利福尼亚湾中部地区的特点是，海面上分布着两个大岛和几个小岛，中间隔着狭而深的海峡，致使洋流速度加快，在风力作用下形成上升流锋面和漩涡，甚至让这片本身就很富饶的海域进一步提高初级生产力。米德列夫群岛地区的生物群丰富多样。海洋哺乳动物的多样性之高几乎涵盖了所有大型须鲸、抹香鲸、大群海豚和众多群栖海狮。岛屿崎岖、多山和干旱，海岸线上散落着几个海鸟群落，一些重要的种群在此筑巢。罗萨岛虽面积狭小，却因在此筑巢而栖的优雅的皇家燕鸥和赫尔曼海鸥占全球比重之高而声名鹊起。 							
15. 下加利福尼亚州沿海海域	L	H	H	H	M	M	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该海域自格雷罗内洛罗泻湖北端、塞德罗斯岛和圣贝尼托群岛和纳和蒂维达岛向南延伸，包括圣伊格纳西奥泻湖和生产力水平高的马格达莱纳湾，以及紧邻该湾西部和北部的近海地区。这一地区属墨西哥国家管辖范围。 该沿海地区面积广阔，坐落其中的大型沿海泻湖是濒危灰鲸种群的哺育和繁殖之所，岛 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
屿和近海地区是浮游动物的重要觅食区。该地区的泻湖对于鲸鱼，以及海鸟、海龟、无脊椎动物和鱼类具有重要意义，岛屿为濒危乌黑鹱提供了筑巢之地，近海地区则是大西洋蠵龟、鲨鱼和金枪鱼至关重要的觅食区域。这些繁殖和觅食场地将沿北美洲太平洋沿岸洄游的灰鲸种群和横穿太平洋抵达日本的蠵龟种群相互联系起来。							
16. 胡安德富卡海岭热液喷口	H	H	-	H	H	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该区域由坐落在三个狭长延伸地带的一组喷口组成，即位于加拿大不列颠哥伦比亚省和美国华盛顿州、俄勒冈州和加利福尼亚州沿岸的胡安德富卡海岭、戈尔达海岭和探险家海岭。只有散布在加拿大和美国专属经济区外的喷口按照具有生态和生物重要性的海域的标准进行了评估。 海底、喷口处物理结构、周边水层（受喷口液体和气体的化学性能和热性能影响）和喷口处生物群落一应符合该项标准。热液喷口的成因在于持续不断的板块构造活动。东北太平洋地区喷口的微生物群落就其生理机能、新陈代谢、热耐受性和盐度耐受性而言，可谓多种多样、罕见而独特。 							
17. 东北太平洋海山	H	M	L	H	H	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：整个海山群系列，包括柯布-埃克尔伯格海山链，均位于东北太平洋海域，北起阿留申群岛，沿卡斯卡迪亚俯冲带向南延伸，直抵轴海山。 东北太平洋海山是指从阿拉斯加湾一直延伸至加拿大不列颠哥伦比亚省和美国华盛顿州和俄勒冈州海岸的一系列海山群。现已根据有关海山形态（包括深度、高度和与邻近海山的间距）的调查数据和知识、预测八放珊瑚和深海珊瑚形成情况的模型，以及根据国家管辖范围内类似海山推测得出的珊瑚分布和数量情况，按照具有生态和生物重要性的海域的标准，对这八组海山群进行评估。该组海山群因地质起源相似，故作为一个独立的具有生态和生物重要性的海域进行评价，火山的构态有利于底栖和浮游物种沿纬线水 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
平线自南向北进行基因流动和迁徙。							
18. 皇帝海山链和北夏威夷海岭	M	M	L	M	M	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：皇帝海山链和北夏威夷海岭北起阿留申海沟，南抵位于北太平洋西部海域的夏威夷群岛西北地区，共绵延约 3,000 公里（北纬 53-30°，东经 164-177°）。 皇帝海山链和北夏威夷海岭北起阿留申海沟，纵贯北太平洋盆地，一直延伸至夏威夷群西北地区。该地区拥有具有重大商业价值的鱼类以及一些珊瑚物种。 							
19. 北太平洋过渡带	L	H	H	L	H	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：北太平洋过渡带的纬线跨度随季节更替，在北纬 28° 至 34° 和北纬 40° 至 43° 之间不断变化，在北半球冬季，会进一步南移。其特点是，如受亚热带锋区影响，向南偏移，如受亚北极锋区影响，向北偏移。 北太平洋过渡带的海洋地貌对北太平洋许多物种生物群落具有特殊重要性。沿纬度梯度递变的物理特性，包括漩涡和锋面区，形成一个食饵资源积聚的高生产力栖息地，从而吸引多种深海掠食性动物——包括濒危和具有商业价值的物种——出没于此。该地貌区还是蓝鳍金枪鱼和未成年蠣龟等物种的洄游走廊。 							
20. 夏威夷信天翁产蛋和孵化期间的主要觅食区	M	H	H	H	H	L	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：北纬 35-45° 和西经 175-155°。 位于该地区西北夏威夷岛繁殖地的黑脚信天翁（世界自然保护联盟濒危名录脆弱物种）和黑背信天翁（世界自然保护联盟濒危名录近危物种）占各物种全球总量的 90%。虽然在产蛋和孵化年度周期（11 月至次年 2 月）的大部分时间里，成年信天翁分布广泛，但它们主要集中在接近繁殖地的锋面栖息地区域进行觅食。黑脚信天翁主要集中在亚北极锋以南的有限地带进行觅食，而黑背信天翁则主要依赖北部亚北极锋区内的较冷水域。 							

表 4. 对东南大西洋地区符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的海域的描述

(详细内容载于《促进描述具有重要生态或生物意义的海洋区域 (EBSAs) 的东南大西洋区域讲习班》附件四的附录,
UNEP/CBD/RW/EBSA/SEA/1/4)。

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
1. 毛里塔尼亚沿岸浅海区和塞内加尔最北部的沿海生境 <ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：西经17.238度至西经16.024度；北纬20.773度和北纬15.802度。 • 本区域包含的特定生境有：北部的蛤蜊和藻砾栖息地、迪米里斯岬南部岩石区、石斑鱼（石斑鱼属）等被过度开发的底层种类以及位于努瓦克肖特南部和查特布尔之间乌鱼产卵区栖息地。在本区域，温度、盐度、悬浮物、营养物质和湍流方面的环境条件差别很大，对本区域的生物多样性有很大影响。本区域的特点是生产效率高（尤其是在透光层）。它成为一个渔业资源的温床和栖息地，渔业资源是该国经济的支柱，也是僧海豹、驼背海豚和海龟等具有巨大生态价值的标志性物种的栖息地。本区域对毛里塔尼亚具有可观的经济和社会意义，是小规模渔业的重要场所。此外，本区域还受到潜在的人为压力（因为它包含城市中心，并且被用于多种用途）。 	H	H	H	M	H	M	-
2. 努瓦克肖特外侧的冷水珊瑚礁 <ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：这些冷水珊瑚礁位于大陆斜坡（斜坡的隆起部分，长约 400 公里）。它们包括班达亚齐和迪米里斯护堤。 • 冷水珊瑚礁出现在 600 米深的毛里塔尼亚大陆斜坡度底部。这些冷水珊瑚礁沿长约 400 公里的斜坡生长。这些珊瑚礁形成名副其实的海山，最高长到高于海床 100 米：即迪米里斯岬外侧的“迪米里斯护堤”和努瓦克肖特外侧的“班达护堤”。 <p>珊瑚是“生态系统工程师”，也是大量生物多样性的家园。然而，人们对毛里塔尼亚活珊瑚和珊瑚礁化石的作用没有什么研究。虽然在 2010 年进行了活珊瑚取样，但对礁石上活珊瑚群落的数量和位置尚未确定。这些水中刚性结构和资源动态的作用尚不得而知。</p>	M	M	-	M	-	M	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
3. 毛里塔尼亚北部的永久上升流 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域加那利上升流生态系统的中心部分，是世界上四个最重要的上升流系统之一（北纬21°）。在寒冷天气期间（11月至6月），强烈的信风将沿海海水推向远海，从而引起营养丰富的冷水从深海向上涌流。夏季（7月至10月）风向改变，毛里塔尼亚海域受到来自南方（几内亚洋流）温暖的表层海水喂养，大部分上升流停止，布朗角（北纬21°）除外，那里常年存在上升流现象。 本区域的特点是拥有大量渔业资源，拥有大量古北区、南极和次区域（包括马卡罗尼亞）海洋鸟类和标志性巨型动物（金枪鱼、剑鱼、旗鱼、鲨鱼、鳐鱼、海豚、瓶鲸、须鲸和抹香鲸）群落。另外，许多中上层鱼类、海洋鸟类（包括塘鹅和瓣蹼鹬）以及大型食肉动物和鲸类动物的季节性存在也值得注意。因此，它是小型中上层鱼类（小沙丁鱼、沙丁鱼、鳀鱼、竹荚鱼和鲭鱼）关键区域之一，占毛里塔尼亚专属经济区渔业总产量的85%以上。它也是大量底层鱼类的主要生活区域，小型深层鱼类为草食物种。这是一个动态系统，具有很高的初级生产力，可以扩大或缩小（在时间或空间方面），并且有可能受到气候变化的影响。 	H	H	M	-	H	H	L
4. 迪米里斯峡谷系统 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：迪米里斯峡谷是毛里塔尼亚专属经济区里最大的峡谷。深 250 米至 300 米，宽为 2 公里至 7.5 公里不等。其走向是沿深海区海岸垂直 450 公里。 峡谷的结构起着一个重要生物走廊的作用，将半深海和深海区的动植物群落与浅海和沿海带生物多样性连接起来。峡谷结构便于将沉积物从沿海运到较深的水域。同样也便于深层水运动到表层。因此，峡谷周围表层水可能成为浮游生物多样性的避难所。峡谷在联系深海平原、斜坡和大陆架生态系统方面发挥重要作用。 	H	M	M	H	H	M	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
5. 卡亚尔海山	H	M	M	-	M	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：卡亚尔海山位于卡亚尔以外，塞内加尔维德角以西 300 公里，处在西经 17.864223°和西经 17.496424°以及北纬 15.832420°和北纬 15.368942°之间。它出现在离海岸约 100 海里的 200 至 500 米深水处。 它一个复杂的海山，由三个海山即卡亚尔海山、小卡亚尔海山和麦地那海山组成。卡亚尔海山是塞内加尔海岸以外罕见的海山之一，具有大量生物多样性和较强的水动力之一。这个包括大量生物多样性和初级生产力的动态水流的积极成果鼓励这些地区的拖网渔业，甚至是小规模渔民，他们经常从事破坏性捕鱼活动。 							
6. 卡亚尔峡谷	H	M	M	M	M	H	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：卡亚尔峡谷大概位于北纬 15°25' 和西经 18°0'。它位于塞内加尔领水和专属经济区内。 卡亚尔峡谷大概位于北纬 15°25' 和西经 18°0'。从其规模及特殊性来讲，该峡谷是个难得一见的生态系统。另外，它还拥有大量生物多样性。本区域是海鸟、海龟和若干沿海浮游鱼类和沿海底层鱼类物种洄游的重要地区。 							
7. 萨卢姆三角洲	M	L	M	M	M	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：西经 17.071° 和西经 16.573°，北纬 14.235° 和北纬 13.601°。 萨卢姆三角洲位于塞内加尔中西部。横跨考拉克镇以西 80 公里的捷斯和蒂克地区，它拥有潮湿、海洋、河口、湖泊和湿地的特点。它是一个两栖区域，由三个大组岛屿组成，环绕着一个密集水路网（一般称为“bolons”）。它是鱼类和水鸟繁殖、寻找食物和栖息的主要环境。这个丰富的环境与许多被红树林包围的滩涂连在一起。 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
8. 卡萨芒斯河口 <ul style="list-style-type: none">地理位置：卡萨芒斯河口位于塞内加尔南部，在大西洋边上。它位于西经 17.150513 度至西经 16.737610 度以及北纬 12.835083 度至北纬 12.393311 度之间。从生物学角度来讲，这一地区包括若干浮游和深层物种的幼苗生长地(圆小沙丁鱼、短体小沙丁鱼、短线竹筍鱼、玟鲹、青铜石斑鱼)。它是若干鱼类、海龟和鸟类的洄游和繁殖区。	M	M	M	M	M	M	L
9. 博阿维斯塔岛 <ul style="list-style-type: none">地理位置：博阿维斯塔海区占地面积介于北纬 15.802917 度和北纬 20.773682 度以及西经 16.024292 度和西经 17.238525 度之间。它涵盖了博阿维斯塔岛的西南和东南部部分以及佛得角境内的若昂瓦伦特、博阿维斯塔和佛得角海山。博阿维斯塔岛周围海区的特点是拥有大量珊瑚，被认为是世界上 10 个珊瑚保护热点之一。它也是大西洋东部边缘最大和世界第三大蠵龟(<i>Caretta caretta</i>)繁殖区。这个区域的生物和生态重要性也因海山的存在而被加强，尤其是若昂瓦伦特、博阿维斯塔和佛得角海山。此外，它还是包括鲨鱼和鲸类在内许多海洋物种的觅食和繁殖区。最后，该区域包含了佛得角的大部分海洋生物。	H	H	H	H	H	H	M
10. 卢西亚、拉苏和布兰科结合体 <ul style="list-style-type: none">地理位置：北纬 16°86' – 北纬 16°51'; 西经 24°85' – 西经 24°51'。位于佛得角群岛以北，圣卢西亚、布兰科和拉苏岛都是无人居住的岛屿，并且位于其他人口稀少的岛屿（圣维森特和博阿维斯塔岛）附近。其生物丰富性和需要保护其生物多样性已促使国家主管部门（环境局）建立了野生生物保护区，并从 2009 年起建立了一个海洋保护区，负责协调保护活动及需要确保当地主要由渔民组成的社区的和谐发展。	H	M	H	H	M	M	H

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
11. 圣安唐岛西北地区	H	M	H	M	H	M	-
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本地区从博阿维斯塔西北延伸，深度从 2 000 米上升到 30 米，位于佛得角圣安唐岛 15 海里处。此地位于北纬 15.802917 度和北纬 20.773682 度以及西经 17.238525 度和西经 16.024292 度之间。 圣安唐岛西北地区是一个具有巨大生物和生态价值的地方，其拥有海山、峡谷和珊瑚等大型生境。该地还为鲸目动物和海龟等许多标志性和濒危物种提供了栖息地，并且具有高水平的生物生产力。圣安唐岛西北是佛得角的主要渔区之一，尤其是金枪鱼，并且还拥有很多特有物种。虽然目前的活动（主要是捕捞）表明对当地生态造成一些干扰，但要评估当地自然或非自然特征（标准 7）还需要有补充数据。 							
12. 比热戈斯群岛	H	H	H	H	H	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：比热戈斯群岛建于几内亚比绍海岸以外，位于迦巴/ 科鲁巴尔河的河口，处北纬 15.802917 度和北纬 20.773682 度以及西经 16.024292 度和西经 17.238525 度之间。它涵盖了一个巨大的岛屿复合体，占地总面积为 1 046 950 公顷，由大小不等的岛屿组成。它向外延伸到海岸 100 公里以外，接近国家管辖范围内的大陆架边缘。 比热戈斯群岛是一个特殊的地方，其特点是拥有许多濒危和标志性物种，拥有大量关键生境和很高的生物生产力。该群岛是古北区鸟类第二大栖息地和非洲大陆绿海龟最大的繁育地。此外，比热戈斯群岛还被认为是锯鳐的最后避难所，锯鳐是西非濒临灭绝的一个物种。该区域包括比热戈斯群岛沿 10 米等深线的整个海洋部分。 							
13. Rio Pongo	L	M	M	M	M	H	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：Rio Pongo，它的名字来源于与它相连的一条河，它位于博法州，处于北纬 10°01' 至北纬 10°13' 和西经 14°04' 至西经 14°12' 的几内亚北部沿海。其表面积为 0.300 平 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
方公里。							
<ul style="list-style-type: none"> 它是很多海洋和沿海生物的幼体栖身、繁殖和生长的地方及洄游通道。Rio Pongo 位于北纬 10°01'至北纬 10°13'和西经 14°04'至西经 14°12'的几内亚北部博法州沿海。相较于海岸线的其他部分，这个地方是白颈鹳、巨鹭、锤头鹳、<i>Ibis ibis</i>、吼海雕和鱼鹰等退化较少的港口鸟类的栖息地。西非海牛 <i>Trichechus senegalensis</i> 也在此栖息。关于 Fatala 和 Motéba 河口海洋生物多样性（浮游植物、浮游动物、虾、底栖生物和鱼类）的数据证实，这个两河口都是值得关注和保护育苗区。一方面，为了确保向几内亚人口持续供应生物产品，另一方面，为了确保可持续地保护鸟类和其他濒危物种，几内亚共和国已在 1992 年 9 月指定 Rio Pongo 为拉姆萨尔湿地。 							
14. 大流星海山	H	-	L	M	H	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域包含大流星海山、小流星海山和克罗斯海山，位于西经 27.75 度至西经 29.5° 和北纬 29.0° 至北纬 30.6° 之间。 大流星海山是在大西洋上最大的海底山脉之一，从海平面以下 4200 米深处上升在海平面以下 270 米处，其椭圆形高原占地面积达 1500 平方公里。整个地区生产力低下；不过，海山周围循环洋流带来了相对较高的生产率，经测量，这里的浮游动物比周边区域多。一种鱼类物种是本地特有的，根据对 56 种桡脚类动物进行抽样的结果，其中有 54 种为本地特有物种。 							
15. Yawari 复合体	M	M	H	L	M	M	-
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于塞拉利昂南部大陆架区域内，位于北纬 7°22'29.66" 至北纬 8°07'16.35" 以及西经 12°41'11.16" 至西经 13°20'11.24" 之间。Yawri 复合体横跨 Yawri 湾、香蕉岛和海龟岛，向南延伸到 Sherbro 岛和 Yawri 湾以西 10 公里，进入相邻的塞拉利昂大陆架水域。 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> Yawri 复合体拥有包括皇家燕鸥（最大海鸥）、西非海牛（<i>Trichechus senegalensis</i>）、鲨鱼和海龟（绿海龟、蠵龟、太平洋丽龟）在内的濒危物种。许多研究已经表明，这个区域是很多有鳍和贝类物种以及濒危海龟的一个非常重要的产卵地。 							
16. 里弗塞斯-格林维尔海龟繁育地	H	H	H	H	M	-	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于利比里亚东南部里弗塞斯和希诺县的南部。离里弗塞斯县的塞斯托斯市约 20 英里，离锡诺县格林维尔市约 10 英里。该地区完全在利比里亚国家管辖范围内。 里弗塞斯-格林维尔是海龟、浮游生物、底栖生物和其他生活在温暖浅水中鱼类物种的繁育地。在大西洋沿岸，可以发现十余种海龟。这里有不同种类的海龟。该地区是沿利比里亚南部大陆边缘发现的。Cape Mount 海山的一部分，特别是 Semberhun、蒙特塞拉特的 Banjor 海滩和 Baford 湾，已被确定为海龟繁育地，但本区域的其余部分主要是里弗塞斯和格林维尔之间的海岸线，因此，这就是对它进行描述的原因。产卵区与 Sanquin 河河口连在一起，而河水带来的大量腐烂木料为本区域的生物提供了栖息地和食物。挑染海鸥、大翅海燕和墨菲海燕等海鸟居住在这一区域。这个区域被认为是一个重点保护区的原因是其具有的生物学意义和海洋生态系统的脆弱性。 							
17. 塔布峡谷和海山	H	H	H	M	H	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于科特迪瓦塔布沿海。 本区域包括一个峡谷和海山，近海水深超过 100 米。海底为沙地或泥地生境，有的地方有沙又有泥，拥有独特的岩相和岩石。拥有非成熟上升流是该地区的另一特点。生物群落包括许多附着或未附着在岩石上的大型藻类（石莼属和马尾藻物种等），它们许多海洋动物、软体动物（主要是贻贝贻贝翡翠）；甲壳类动物（以真蝦龍屬多刺龙虾、拟蝉虾属琵琶虾以及对 <i>notialis</i> 虾为主）；浮游鱼类；底层鱼类（大眼裸颌鲈等（Val. 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
1834）， <i>Sardinella aurita</i> C.V.、 <i>Sardinella eba</i> 、 <i>Anchoviella guineensis</i> 、 <i>Pseudolithus senegalensis</i> V.、 <i>Pseudolithus typus</i> BLKR 和 <i>Ethalosa fimbriata</i> Bowdich；爬行动物（以 <i>Dermochelys coriacea</i> 棱皮龟、 <i>Lepidochelys olivacea</i> 榄蠵龟、 <i>Chelonia mydas</i> 绿海龟和 <i>Eretmochelys imbricata</i> 玳瑁等为主）；以及西非海牛（ <i>Trichechus senegalensis</i> ）等水生哺乳动物提供了庇护和觅食地，也可为其提供食物。							
18. 阿比让峡谷和无底洞	H	H	M	M	H	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于北纬 3°至北纬 5°，西经 3.8°至西经 4.3°，将垂直于海岸线的科特迪瓦海域分成两块：西部从阿比让到利比里亚边界和东部从阿比让到加纳。 在阿比让的海洋区域，科特迪瓦有一个峡谷和无底洞，维持着其海洋生物多样性遗产。深度超过 3000 米，该峡谷和无底洞拥有丰富的底栖生物群落（约 200 种多毛类物种）和鱼类，包括属于沿海上层鱼类的 6 个科和 17 种鱼类，主要由 <i>Sardinella aurita</i>、<i>S. eba</i>、<i>S. rouxi</i> 等组成。底栖生境主要是泥和独特的岩相，比如，粪便颗粒，接收了来自阿比让市的所有污染物。最后，峡谷和无底洞还有助于海洋环境以及 Ebrié 和 Grand-Lahou 泻湖的自我净化，并且有助于该地区的生态平衡。 							
19. 从塔布到阿西尼的虾和沙丁鱼洄游路线	H	H	H	M	H	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：塔布-阿西尼海域位于北纬 5°至北纬 4°以及西经 7°至西经 3°之间。 500 多公里长的海岸线景观主要由常绿森林、沼泽森林、红树林、泻湖前草原、自然公园和保护区、水道与海或泻湖的直接通道、以及 Fresco、Grand-Lahou、Ebrié 和 Aby 泻湖组成。西部主要由海上悬崖和沙滩组成，沙滩是海龟的休息场所。而东部主要以沙滩为主，经常出现严重的侵蚀和封闭河口区。该区域是几内亚洋流和逆流的经过区域，产生成熟且营养丰富的季节性上升流。这些上升流是形成本区域食物网的基础。在这个生物链中，第一个环节是产生了浮游植物。浮游动物的产量也比较高。每年的虾生产量在 600 至 800 吨之间浮动，而鱼产量（主要是以沙丁鱼为主）为每年 30 000 至 40 000 吨之 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
间。此外，还有 300 多种鱼类采样，本区域拥有全国 80% 以上的海洋物种。							
20. 科特迪瓦沿海专属经济区	M	H	H	M	H	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于北纬 3° 至 0° 和西经 2.5° 至西经 8.5° 之间，其水深超过 100 米。 科特迪瓦拥有专属经济区内的海洋水域和一个具有重要生态或生物意义的特殊海洋区域，是一幼年和成年深海红蟹 (<i>Geryon maritae</i>)、包括青花鱼 (<i>Thunnus albacares</i>)、回跳鱼 (<i>Katsuwonus pelamis</i>)、大眼鱼 (<i>Thunnus obesus</i>)、长鳍鱼 (<i>Thunus alalunga</i>) 在内的洄游鱼类、包括小金枪鱼在内的金枪鱼 (<i>Euthynnus alleterratus</i>) 和鲭鱼 (<i>Auxis Thazard</i>)、大西洋旗鱼 (<i>Istiophorus albicans</i>)、旗鱼 (<i>Xiphias gladius</i>) 和鲨鱼的洄游、繁殖和成长之地。底栖环境是以泥底和独特的岩相为主，该地区的特点是拥有强大且成熟的上升流。该地区面临的主要威胁是非法捕捞、过度开发和污染以及外来入侵物种。鉴于该区域具有重要社会经济意义，有许多研究正在那里进行；正在修建一个金枪鱼观测站，据预计，观察人员很多会参加那里的金枪鱼活动。 							
21. Agbodrafo 沿海和海洋生境	M	H	H	H	H	H	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于多哥国家管辖范围内。它主要由沿海区域组成，并以大陆架为界。其地理坐标如下： <p>北纬 东经</p> <p>6°09'00" 1°18'00";</p> <p>5°56'24" 1°20'24";</p> <p>6°00'00" 1°34'48";</p> <p>6°12'32" 1°31'12"。</p> Agbodrafo 沿海和海洋生境位于西部洛美自治港与 Kpémé 矿石港之间。它主要沿海区组 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
成, 到大陆架为止, 并且具有成为一个非常重要的生物群落的显著特点。它以沙底、人工鱼礁(其中包括三个沉船)以及管道设备结构为主。“沙滩石”是这个生境的重要组成部分, 因为它成为周围很多藻类群落生长的基础。除了在多哥发现的 452 种鱼类物种之外, 这个区域还是四种海龟(绿海龟、玳瑁、太平洋丽龟和棱皮龟)的产地, 最后两种海龟沿着整个海岸线栖息。它是一个绿海龟(<i>Chelonia mydas</i>)的觅食地, 这种海龟是以海滩岩石生长的藻类为食。本区域还拥有包括驼背豚(<i>Sousa teuszii</i>)在内的 16 种海洋哺乳动物。在这些物种中, 大多数属于自然保护联盟红色名单上的濒危物种。除其他外, 该区域正在受到包括海岸侵蚀、各类污染、海上交通增长和对自然资源过度开发在内的各种威胁。							
22. Bouche du Roi-Togbin <ul style="list-style-type: none"> 地理位置: 本区域位于多哥境内, 地理坐标如下: <p>北纬 东经</p> <p>6°19'35" 1°54'33";</p> <p>6°20'43" 2°20'33";</p> <p>6°00'00" 1°54'32";</p> <p>6°00'00" 2°24'28"。</p> Bouche du Roi-Togbin 海区是沿海平原的一部分, 是由潮滩和泻湖分隔开的沿岸沙滩的复合体。水深为 0 到 1,000 多米不等。该区域还有小型季节上升流。这个过程助长了生物群落的增殖, 包括浮游植物、浮游动物、附着在孤立岩石和珊瑚礁藻类、甲壳类、中上层和底层鱼类、鲸类和包括海龟在内的海洋爬行动物。选择这个地方的原因是自愿削减授权渔获物和增加捕鱼配额管理的结果。 	H	H	H	H	M	M	L

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7										
	关于标准的略语见第 2 页																
23. 多哥-贝宁交界海域 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：这个跨界区域横跨多哥和贝宁两国。从性质上讲，它主要是沿海区，并且止于大陆架。它位于多哥和贝宁两国的国家管辖范围内。它位于多哥 Aného 关口和贝宁莫诺河口之间。其地理坐标为： <table> <tr> <td>北纬</td> <td>东经</td> </tr> <tr> <td>6.23°</td> <td>1.58°;</td> </tr> <tr> <td>6.03°</td> <td>1.63°;</td> </tr> <tr> <td>6.12°</td> <td>1.99°;</td> </tr> <tr> <td>6.30°</td> <td>1.96°。</td> </tr> </table> 它是一个狭长的区域，沿海岸长约 27 公里，并向海延伸超过 22 公里。两个河口为沿海和海洋生态系统的高生物生产力提供了良好条件。这两个国家都拥有大量海洋和沿海生物多样性，拥有一些目前已被列入自然保护联盟红色名录的标志性物种，并且适用于很多有关保护生物多样性的国际条约。不过，这一区域面临很多威胁，主要原因是因为人类住区和资源开发，特别是因为大坝和矿井等大型公共工程建设。 	北纬	东经	6.23°	1.58°;	6.03°	1.63°;	6.12°	1.99°;	6.30°	1.96°。	L	H	H	H	M	M	L
北纬	东经																
6.23°	1.58°;																
6.03°	1.63°;																
6.12°	1.99°;																
6.30°	1.96°。																
24. 克里比-坎波 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于喀麦隆境内，地理边界大约如下：最远端到(32N591356; 259684); (600000; 320000); (574337; 320000); (574337; 262513)。 克里比 - 坎波海域是喀麦隆生物多样性最丰富的地区之一。除了海龟栖息地之外，它包括考古遗址和神秘的岩石（Rocher du Loup）。那里还有 Lobé 瀑布，直接落入大海。喀麦隆政府意识到需要在克里比 - 坎波海域建立一个海洋保护区。尽管受到克里比深水港建设项目带来的威胁，但这个计划已经取得了很大进展。此外，该区域位于克里比沿岸 	H	M	M	M	-	-	L										

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
以外，占地总面积约为 126 053 公顷，已被森林和野生动物部部长宣布为一个公益的海洋区。							
25. Lagoa Azul 和 Praia das Conchas	H	H	H	H	H	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：圣多美岛是圣多美和普林西比国的一部分，该岛位于大约北纬 2°32'至北纬 2°43'和东经 7°20'至东经 7°28'之间，拥有 143 公里直线海岸，离非洲大陆 300 公里，土地面积为 859 平方公里，并且拥有大陆架面积 436 平方公里，拥有小规模渔业区 3 171 平方公里。 这一海域包括许多生态系统，由很多生境组成，其中包括众多海洋动物经常光顾的 33 个海湾、珊瑚、岩石、沙底和海滩，这些动物中包括鱼类（西非石斑鱼、大西洋旗鱼、<i>Caranx crysos</i>、大西洋鲭鱼、小鲔、<i>Hemiramphus balao</i> <i>Cypselurus melanurus</i>、<i>Trachurus trachurus</i> 和鲣鱼）、海龟（棱皮龟、玳瑁、太平洋丽龟、绿海龟和 <i>Caretta caretta</i>）和海鸟（<i>Egretta garzetta</i>）等。这些动物的生命周期的全部或部分发生在这个区域，这些动物有时对大型渔业起到支撑作用，有助于改善沿海社区人民的福祉。 							
26. Ilhas Tinhosas	H	H	H	H	H	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本海区位于普林西比岛上，是圣多美和普林西比国的一部分，它位于圣多美岛以北约 160 公里处，处于北纬 1°32'至北纬 1°43'和东经 7°20'至东经 7°28'之间，距离非洲大陆 220 公里。主岛总面积为 142 平方公里，并且与几个小岛连在一起。 本海域呈现不同的生态系统和生境，包括很多海龟物种筑巢和产卵的沙滩，其中最重要的是棱皮龟、玳瑁、太平洋丽龟、绿海龟和蠵龟。此外，本地区还盛产许多本地特有的珊瑚（<i>Montastraea cavernosa</i>、<i>guineense</i> 和 <i>Porites bernardi</i>）、底层鱼类（<i>Epinephelus goreensis</i>）、中上层鱼类(<i>Istiophorus albicans</i>、<i>Caranx crysos</i>、<i>Scomber scombrus</i>、<i>Euthynnus alleteratus</i>、<i>Hemiramphus balao</i>、<i>Cypselurus melanurus</i>、<i>Trachurus trachurus</i> 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
和 <i>Katsuwonus pelamet</i> 等)和鲨鱼(皱唇鲨真鲨、沙条鲛和双髻鲨)。最后，该地区还是白尾鹲、乌燕鸥、 <i>Sula eucogaster</i> 、燕鸥和 <i>Anous minute</i> 等很多海鸟经常来的地方。							
27. 马永巴海洋和沿海区							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：这一部分加蓬海岸的特殊性是关系到广大泻湖区的存在，从这一海域以北 500 公里处的费尔南瓦斯泻湖一直延伸到刚果边界以外。 马永巴海洋和沿海区的特点是拥有大型水生哺乳动物（鲸、逆戟鲸、鲨鱼和海豚）以及在覆盖植被的沿岸海滩上拥有大型陆地哺乳动物（大象、水牛和河马），特别是每年 10 月至次年 4 月到此产卵的棱皮龟。 <p>马永巴海岸拥有一个狭长的沙滩、被几个较小的泻湖包围的一个大泻湖、红树林生态系统、沿岸海滩和沿海远古沙丘，沙丘背后是一片正在发展壮大的沿海热带稀树草原和森林。本区域的明显特征是其拥有丰富的生物多样性：它不仅是近岸动物（龙虾、鬼蟹）的家园，也是鸟类、灵长类动物（山魈、大猩猩和黑猩猩）以及众多沿海和海洋渔业资源的家园。</p>	H	H	H	H	H	H	
28. 西北大陆架							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：它位于黑角港海岸以外，包括 120 至 450 米等深线之间区域以及以外部分。该地区位于刚果国家管辖范围内。 本区域的特点是拥有很高的沿海水域生产率、生物多样性和大量鱼类种群。本区域位于 120 米和 450 米等深线之间，拥有 20 公里宽的倾斜平地。本区域水深的大概情况如下：刚果海岸以外，加蓬北部-刚果部分地形简单，是一个规则且略微倾斜的底部，深度达 100 米，出露层在 75 米至 100 米之间。生物资源群落包括深海底层资源和近海中上层资源。它位于水深 120 米及以上的大陆架上。它在气候和资源的变异性方面具有特殊性。 	H	H	L	M	M	M	H

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
29. 穆安达沿海和海洋区域 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域占地面积约 66 000 公顷，其地理坐标位于南纬 5°45'至南纬 6°55'和东经 12°45'至东经 13°之间，在刚果民主共和国境内。 刚果民主共和国的大西洋海岸有 40 公里长，在海洋红树林公园，生长有大面积的红树林，一直到其与安哥拉的 Cabinda 省北部边界。这个沿海地区的西部地区占地面积约为 11 万公顷。 海洋红树林公园被分为两个区域：A 区，由受到野生生物保护的红树林组成；B 区，由潮湿的热带稀树草原和沿海地带组成，这里受到部分保护。该地区包括海龟巢居的海岸线、红树林周围区域以及由毗邻的刚果民主共和国在大西洋地区的刚果河影响区水下峡谷形成的海洋盆地。本区域符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准，因为其具有重要的海洋生物多样性意义。人们可以在这里看到海牛、河马、鲸、海豚、海龟、鱼、海鸟、软体动物、甲壳动物、红树林等。此外，由于峡谷的存在以及刚果河河口的影响，导致在本区域形成了一个海相盆地。除此之外，本区域还存在上升流现象，吸引了许多海洋动物，从而为动物觅食和繁殖创造了有利的生存环境。该盆地的存在也对初级生产、盐度、海洋生物分布、海洋流体力学和本格拉和几内亚洋流的方向起到了促进作用。 	M	M	H	M	M	H	-
30. 赤道金枪鱼生产区 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域横跨赤道，起源于刚果海相盆地；其水深超过 100 米，有时超过 1,000 米。 毗邻几内亚洋流的非洲沿海国家的近海海域都有所谓“赤道生产区”的区域海区，它符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准，因为它是金枪鱼及相关物种（包括青花鱼 (<i>Thunnus albacares</i>)、回跳鱼 (<i>Katsuwonus pelamis</i>)、大眼鱼 (<i>Thunus obesus</i>)、长鳍鱼 (<i>Thunnus alalunga</i>)、包括小金枪鱼 (<i>Euthynnus alleterratus</i>) 在内的金枪鱼以及 	H	H	M	M	H	M	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
鲭鱼 (<i>Auxis Thazard</i>)、大西洋旗鱼 (<i>Istiophorus albicans</i>)、箭鱼 (<i>Xiphias gladius</i>)、鲨鱼和鳐鱼) 的幼体和成年洄游、繁殖和成长的地方。据估计，金枪鱼的年渔获量为 20 万吨以上。底栖生境主要由泥和独特的岩相组成，且该地区拥有季节性强大成熟上升流。鉴于该地区的社会经济意义，已对动物和环境进行了很多研究。							
31. 加那利和几内亚洋流交汇地							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域大约位于北纬3°至北纬15°以及西经12°至西经25°之间，包括塞内加尔南部、冈比亚、几内亚、几内亚比绍、塞拉利昂和利比里亚北部以及国内和专属经济区海域的生态系统和生境，并且延伸到由很多海山组成的深海水域。 本区域是许多生态系统、生境以及尤其是海山的家园。本区域拥有粉红虾 (<i>Penaeus notialis</i>)、槽虾 (<i>P. kerathurus</i>)、多刺龙虾 (<i>Panulirus spp.</i>) 和软体动物等物种。也有中上层和底层鱼类，包括 Clupeidés、Sciaenidés、Drepanidés、Polynemidés、Pomadasiyidés、Lutjanidés、Cynoglossidés、Psettoididés (<i>Psettodes belcheri</i>)、Tetraodontidés (<i>Lagocephalus laevigatus</i>)、Gerridés (<i>Gerres melanopterus</i>)、Ariidés (<i>Arius spp.</i>)。高度洄游鱼类典型代表包括长鳍金枪鱼 (<i>(Thunnus albacares)</i>) 回跳鱼 (<i>Katsuwonus pelamis</i>)、大眼鱼 (<i>Thunus obesus</i>)、长鳍鱼 (<i>Thunnus alalunga</i>)。在本区域，人们还可以看到包括小金枪鱼 (<i>Euthynnus alleterratus</i>) 在内的金枪鱼以及鲭鱼 (<i>Auxis Thazard</i>)、大西洋旗鱼 (<i>Istiophorus albicans</i>) 和箭鱼 (<i>Xiphias gladius</i>)、鲨鱼和西非海牛 (<i>Trichechus senegalensis</i>) 等水生哺乳动物。最后，除其他外，本区域还拥有白颈鹳、巨鹭、锤头鹳、<i>Ibis ibis</i>、吼海雕和鱼鹰等鸟类。本地区的另一个特点是拥有强劲的上升流，这是本海域拥有很高生产率的基础。 	H	H	H	M	H	H	M
32. Ramiros-Palmerinhas 沿海区	M	H	H	M	M	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于安哥拉罗安达市以南。它不包括姆苏鲁半岛，但包括泻湖和 Cazanga 岛，以及南到宽扎河的沿海区域。 本区域包括两个河口、几个小的沿海岛屿、红树林和沙滩。本区域的植物是以慢速生长 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
的盐沼物种和生长在潮滩其他动植物为主。本区域是濒危海龟的重要繁殖地，是螃蟹幼体的繁育地，并且拥有大量其他物种。红树林及相关生境及有些品种（如筑巢海龟）对影响其生态系统功能（避难、繁殖和觅食区等）的人为压力（例如，交通、污染、开采、开发及相关碎片化）非常敏感。鉴于本区域的物种生长和繁殖缓慢，且因此生物群落下降/毁林（包括海龟、海牛、红树林）后的恢复速度缓慢，故被视为生态系统脆弱区。							
33. Kunene-Tigress <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：根据划界规定，本区域占地约 4 841 平方公里（103 公里×47 公里），最北到 Tigres 岛以北 10 公里，最南到 Kunene 河口以南 2 公里，近海范围 25 海里。本区域完全在其横跨的两个邻国（即安哥拉和纳米比亚）国家管辖范围内，其中 80% 以上面积属于安哥拉管辖范围内。 Kunene 河和 Tigres 岛-海湾复合体因各种物理化学过程被完整地联系在一起。虽然相隔 50 公里，但 Kunene 河仍然影响河口北部 Tigres 海湾的盐度、泥沙和生产力。这个区域的特点是它的独特性、对候鸟的重要性、繁育功能及其生境和物种的多样性。 	H	H	M	M	M	H	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
34. 纳米比亚群岛	L	H	H	H	M	L	M
<p>• 地理位置：本区域由位于南纬 24 度至 27 度之间的四个岛屿组成（作为一个整体），处于纳米比亚国家管辖范围内。</p> <p>• 纳米比亚近海岛屿都位于密集的卢德里兹上升流内本格拉洋流大型海洋生态系统（BCLME）中心区。对纳米比亚近海岛屿对濒危和脆弱海鸟物种的生命历史阶段具有重要意义。这四个岛屿（水星岛、哈利法克斯岛、Ichaboe 岛和波塞申岛）是现有纳米比亚群岛海洋保护区内的海鸟繁殖地。每个岛周围 5 公里的缓冲区被用于为具有重要生态或生物意义的岛屿和毗邻海洋环境划界。</p>							
35. 奥兰治锥形区	H	H	M	M	M	M	M
<p>• 地理位置：该河口位于南纬 29°，形成南非和纳米比亚的沿海边界，并且继续在西南方向海洋延伸。本地区向北延伸 30 公里，一直到奥兰治河南岸，离海岸线约 60 公里，虽然离海岸线最远处达 100 公里，但本地区仍然具有奥兰治锥形区海洋环境的特点。本区域横跨南非和纳米比亚两国国家管辖范围内的海洋区域。</p> <p>• 对于海洋环境的径流而言，奥兰治锥形区是南非的主要河流。河口拥有丰富但已被改变的生物多样性。沿海地区包括极度濒危生境（纳马夸沙质近海）。海洋环境经历缓慢、可变洋流和弱风，使其成为中上层鱼类潜在的有利繁殖区。此外，事实证明，由于河流流出物对 Thukela 海底斜坡（一个类似浅海细粒淤积环境）地区吸引鱼类重要性，有可能对奥兰治锥形区内海也具有类似的生态依赖性。本区域以南 300 公里（Olifants 河）和以北 1300 多公里（Kunene）没有遇到类似的河口/近海生境。南非和纳米比亚正在考虑在奥兰治河河口建立一个跨界拉姆萨尔湿地保护区。总之，这个区域被认为在“唯一性或稀缺性”和“对物种生命历史阶段的特殊重要性”方面具有重要意义。</p>							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
36. 奥兰治大陆架边缘	L	M	H	M	M	H	H
<p>• 地理位置：本区域位于南非和纳米比亚西部外大陆架及大陆架边缘，处于两国边界毗邻区内。它位于两个国家的国家管辖范围内。</p> <p>• 在纳米比亚一侧，它包括特里普海山和一个大陆架凹进峡谷。南非境内区域已知由硬质未固化底层大陆架/大陆架边缘生境组成，至少包括已查明的 60 个近海底栖生境类型中的 3 个。根据近期对南非沿海和海洋生境进行的一次威胁状况评估，这三种类型生境正在受到威胁；其中一个生境为极度濒危。不过，本地区是南非处于相对自然/原始状态的少数濒危生境类型中的一个。根据对系列拖网调查数据进行长期分析的结果，该地区已被确定为底层鱼类生物多样性的持续热点。这可能与该地区的异质生境有关。总之，根据具有重要生态或生物意义的海洋区域标准：“对受威胁、濒危或下降物种和/或生境的重要性”、“生物多样性”和“自然”，本区域被认为非常重要。</p>							
37. 柴尔兹海底斜坡	H	L	M	H	L	M	H
<p>• 地理位置：柴尔兹海底斜坡大约位于南非西海岸 Hondeklipbaai 以外 190 海里，完全位于南非国家管辖范围内。</p> <p>• 柴尔兹班克是南非专属经济区内出现的特有水下海底斜坡地貌，在南非西部大陆边缘从水下 400 米上升到 200 米。这个区域包括五类底栖生境，海底斜坡本、外大陆架及大陆架边缘、起支撑作用的硬质生境和未固化生境。本区域内的一类生境被评定为“极度濒危”，另外两种被评定为“脆弱”。然而，海底斜坡本身的海底区域被认定为处于“良好”自然状态，表明其生态状况和过程均处于完好状态。柴尔兹海底斜坡及相关生境均以支持结构复杂的冷水珊瑚、水珊瑚虫、柳珊瑚以及由构成脆弱海洋生态系统组成的玻璃海绵等物种而闻名。根据以下具有重要生态或生物意义的海洋区域标准：即，“独特性或稀缺性”、“脆弱性、易变性、敏感性或恢复缓慢”和“自然”，柴尔兹海底斜坡区域非常重要。</p>							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
38. 纳马夸沿海地区	L	M	H	M	H	L	H
<ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：本区域在南非国家管辖范围内，处于南非西海岸纳马夸生物区内。它北以斯波伊格河口为界，南以苏特河河口为界。 • 纳马夸生物区的特点是生产率高和沿岸拥有大量生物。本区域中大部分地区的生境处于相对较好（自然/原始）状态下，原因是相对于北方省其他沿海地区其受到人类压力要低得多。因此，本区域对当地出现的几种受威胁生境（包括一些已被列为极度濒危的生境在内）非常重要。本区域也被认为是对保护河口地区和沿海鱼类物种非常重要，并且以下具有重要生态或生物意义的海洋区域标准方面：即“生物生产力”、“对受威胁、濒危或减少物种和/或生境的重要性”和“自然性”，本区域非常重要。 							
39. 开普峡谷及周围地区	M	H	H	H	H	M	M
<ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：本区域位于南非西南海岸以外，完全在南非国家管辖范围内。本区域包括开普峡谷、毗邻大陆架边缘、外大陆架区域和内大陆架区域以及圣海伦娜湾的一部分。本区域还包括兰吉泻湖和萨尔达纳湾以外岛屿。 • 开普峡谷是南非西海岸以外两个海底峡谷之一，这是一个比较广阔区域，已被公认是三个系统保护计划中的一个重要区域。既有底栖地貌，也有深海地貌，该地区对中上层鱼类非常重要，是海洋哺乳动物和一些受威胁海鸟物种的重要觅食区。大陆架边缘上的峡谷和泥质地貌是有限的生境类型，被认定为极度濒危。还有证据表明，海底峡谷拥有脆弱的生境形成物种，本区域还有其他特有和潜在脆弱底栖生物群落。硬地区域，特别是拖网足迹没有覆盖的区域，也可能受到破坏，并且本区域的石油和采矿活动也越来越多。本区域内有几个小的沿海海洋保护区。 							
40. 布朗斯海底斜坡	H	H	H	M	M	L	M
<ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：布朗斯海底斜坡包括沿南非西部大陆边缘的外大陆架和大陆架边缘。本区域 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
位于南非西南海岸以外，完成在南非国家管辖范围内。							
<ul style="list-style-type: none"> 本区域包括一个特有卵石生境、造礁冷水珊瑚和无拖网硬地。它是底层和中上层鱼类的重要产卵区。产卵区与西海岸近海区和阿古拉斯海底斜坡的幼苗生长区连在一起，并且具有以北区域更好的保留区。阿古拉斯和南部本格拉生态区与本区域东南边界相连，零星的大陆架边缘上升流提高了外部边缘的生产率。本区域对受威胁生境和物种非常重要；其中包括极度濒危的底栖生境，并且可能与两个拟议的海上重要海鸟区重叠，即科里海鸥海鸟区和大西洋黄鼻信天翁海鸟区。本区域已被两个系统的生物多样性计划确定为一个优先区域，满足生境代表、脆弱海洋生态系统和鳕鱼产卵地的目标。 							
41. 纳马夸化石林	H	-	-	H	M	-	-
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于南非纳马夸陆地海岸以外 120-140 米深的中心大陆架上。处于南非专属经济区内。 纳马夸化石森林是一个小的（2 平方公里）露出水面的海底岩石，位于南非西海岸大约 30 公里以外，由水下 136-140 米深的化石罗汉树组成。化石树干已被脆弱、正在形成的礁石珊瑚生境所占据，这一情况得到了潜水调查影像的证实。露出水面的岩石为高达 $5 \times 1 \times 0.5$ 米横向延伸的石板。根据区域侧扫声纳解释，露出水面的岩石据信是本区域特有的。这个地方被认为是未被开采的地方，尽管它可能属于当前钻石采矿租凭区范围内。综上所述，纳马夸化石森林被认为是有大量复杂结构的特有地貌，非常容易受到底栖影响。 							
42. 纳米布洄游路线	M	H	H	M	H	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：纳米布洄游路线位于十字角和桑威奇港之间的 Dorob 国家公园和纳米布诺克路福公园的一块近海区域上，处于南纬 21 度至南纬 24 度之间。该区域向海上延伸 50 海里，位于纳米比亚的国家管辖范围内。 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 纳米布洄游路线是本格拉系统中的一个高产区，吸引了大量的海洋和近海鸟类、海洋哺乳动物、海龟和其他动物。它包含两个海洋拉姆萨尔湿地、四个重要鸟类保护区和两个拟议离岸重要鸟类保护区。卢德里兹上升流与沿岸漂移和盛行陆上风进一步影响其北部。由于繁盛期推迟，本格拉洋流的初级产量是纳米比亚海岸中部地区最高的。 							
43. 本格拉上升流系统	H	H	H	M	H	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本格拉上升流系统的地理范围是从南部的好望角到安哥拉-纳米比亚边界(南纬 17°15')，北部沿非洲西南海岸。此外，它还被划定为从高水位线向大于源自垂向归纳模型（VGPM）的全球海洋生产力估计平均值每天 1000 mg C/m² 生产率极限过渡的区域。在北部地区，本格拉上升流系统近海边界区延伸到纳米比亚和安哥拉专属经济区以外。 本格拉上升流系统的北部和南部以温暖水流系统为界，并且具有很高的初级生产力（大于每天 1000 毫克 C/m²）。这种高生物生产力支持了众多商业、手工业和休闲渔业。它包括重要的鱼类产卵及育苗区以及濒危和受威胁鸟类物种的觅食区。另一个关键特征是本格拉北部的硅藻泥地带。这包括以正在氧化的硫化物细菌为生的区域特有低氧底栖生物群落。 							
44. 鲸湾海脊	H	H	M	M	-	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：该地貌完全在国家管辖范围以外，从纳米比亚-安哥拉大陆边缘(南纬 19.3°)倾斜着向大西洋中部海脊(南纬 37.4°)的特里斯坦达库尼亚岛群延伸。 鲸湾海脊是一个重要海山山脉，形成一个从非洲大陆边缘向南部大西洋海脊的自东向西的桥梁。它是一个独特的地貌特征，很可能对与海山有关的脆弱无柄大型动物和底栖鱼类特别重要。虽然鲸湾海脊有底层渔业活动，但商业捕鱼活动的空间范围被限制在一个相对较小的区域。由于深度变化，从斜坡到最高处和表层水域，本区域很可能是维持一 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
个相对较高的生物多样性。这一地貌特征维持了很多全球濒危海鸟。							
45. 亚热带交汇区 <ul style="list-style-type: none"> • 地理位置：本区域是一个从西经 9°至西经 18°到南纬 36°至南纬 43°的细长多边形，并将鲸湾海脊和大西洋部海脊的边缘与西部连接起来。该区域的特有地貌的边界一直延伸到南纬 31°，并向下延伸到南纬 45.5°。该亚热带交汇区的海洋学特征继续向西一直延伸到南美大陆边缘。本区域最西端不包括特里斯坦达库尼亚群岛的国家管辖区域。该区域完全位于国家管辖范围以外的海洋区域内。该亚热带交汇区北与亚热带环流相接，南与南极绕极洋流最北端洋流边缘相连。 • 与北部贫营养水域相比，本区域生产率很高，并且支持大量生物区。本地区拥有的物种包括南方黑鲔、南露脊鲸以及被自然保护联盟确认为受威胁物种的海鸟，其中包括极度濒危的特里斯坦信天翁。 	M	H	H	M	M	M	L

表 5. 对北极地区符合具有重要的生态或生物意义海洋区域标准的区域的描述

(详细内容载于《促进描述具有重要生态或生物意义的海洋区域 (EBSAS) 的北极区域讲习班报告》附件八的附录,
UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/1/5)。

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
1. 北冰洋深海边缘冰区和季节性冰盖	H	H	M	H	H	M	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置: 本区域由表层冰面以及国家管辖范围以外区域水深超过500米水域边缘海冰区相关联的相关水体组成。从地理和时间上讲, 处于浮冰群边缘的边缘浮冰区是一个动态地貌, 由于北极浮冰群每年都可能发生变化, 所有其面积、形状和地理位置也会变化。本区域多年边缘冰的范围已被限制在国家管辖范围以外海域且位于讲习班的地理范围内水深超过500米的水域。 在北冰洋中部的盆地, 大面积的区域常年被冰层覆盖, 因此, 冰缘和季节性冰区在夏季会有一段露出水面的时期。在北冰洋深处这个新的重要冰缘/季节性冰区和季节性露出水面的区域会随时间和空间变化而变化。由北冰洋深海(水深超过500米)上的季节性冰盖而形成边缘浮冰区是国家管辖范围以外区域的一个显著且独特的地貌特征。这种冰的生境在北极别的地方没有。无论是在冰区, 还是在水体, 海冰都会改变初级生产的数量、时间和位置, 并且可能会在整个生态系统内发生连带效应。本区域对几种北极特有物种非常重要。有些与冰相关的物种被自然保护联盟列为脆弱物种和/或被奥斯卡委员会列为受到威胁和/或正在下降的物种。对于与冰相关的物种来说, 边缘浮冰区及沿岸水道是其重要觅食区。对于某些海洋哺乳动物来说, 海冰是重要的繁殖、换毛和休息(拉出)的生境。 							
2. 北冰洋中部多年海冰	H	M	M	H	L	L	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置: 本区域由表层冰面以及与多年海冰区相关联的相关水体组成。从地理和时间角度来讲, 这个区域被描述为一个动态区域。此种描述中提到的多年海冰范围系指国家管辖范围以外的区域。 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 本区域提供了一系列全球和区域重要生境。由于气候变化的原因，对不断变化的冰况预测表明，北冰洋中部国家管辖范围以外区域以及邻近加拿大水域保留冰的时间很可能比北极其他地区更长，从而为包括脆弱物种在内的全球以冰为生的特殊物种提供栖息地，因为冰的丧失仍在继续。向较少多年海冰转变将会影响到本区域的物种构成以及初级生产者的产量，并且可能会在整个生态系统内产生连带效应。在冰盖不断减少的情况下，对多年海冰边缘生活的冰上动物的影响将是最大的。北极熊 (<i>Ursus maritimus</i>) 高度依赖于海冰生境，因此，特别容易受到海冰范围、持续时间和厚度变化的影响。多年海冰生境对南部和北部波弗特海亚群北极熊的繁殖生境特别重要。 							
3. 摩尔曼滨海和瓦朗厄尔峡湾 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于巴伦支海内。东以白海为界，西到俄罗斯/挪威海上边界为界。本区域受摩尔曼斯克近海洋流影响，通常距离海岸 30 公里范围之内，且一般浓度不到 200 米深。 本区域的特点是生产率非常高的（每年净初级生产力的 9-13%）且底栖生物量大。它是若干种中上层鱼类（例如，毛鳞鱼、沙鳗）的产卵区，而滨海有大量海鸟群体（超过 50,000 对不同种类的繁殖鸟）。鸟类众多的原因是东部和西部物种的分布范围的重叠。科拉半岛海岸是很多来自巴伦支海东部海鸟的过冬区。它还在维持海洋哺乳动物种群方面发挥重要作用，成为灰海豹 (<i>Halichoerus grypus</i>) 的重要觅食和繁殖区和小须鲸、港湾鼠海豚 (<i>Phocoena phocoena</i>) 和逆戟鲸 (<i>Orcinus orca</i>) 的觅食区。科拉半岛的沿海水域也是白鲸 (<i>Delphinapterus beluga</i>) 的洄游走廊和觅食区。自然保护联盟红色名录所列其它鲸类也经常在这里出现，如座头鲸 (<i>Megaptera novaeangliae</i>)、塞鲸 (<i>Balaenoptera borealis</i>) 和白喙豚 (<i>Lagenorhynchus albirostris</i>) 等。 	M	H	H	H	H	H	
4. 白海	H	H	M	H	M	H	H

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域包括除沃罗卡北部以外的整个白海，从海洋学角度上讲，沃罗卡北部与巴伦支海接近。本区域完全位置俄罗斯联邦专属经济区范围内，但包含国际海上航线。 白海是欧洲最年轻的海，拥有特有的海洋学状况，有深层冷水形成的 Gorlo 海峡。Gorlo 区域的特点是强劲的潮流引起高湍流，并将向下混合水体一直到海底。它将冷水传播到南部，并且填满整个白海深海区并且温度常年保持零度以下。这些特殊条件形成一个生物边界，限制了动物从外部区域进入白海。 <p>充满冷水的深海区为浮游和底栖生物群落提供了生境，而上层和浅水区则拥有典型的寒带动物和水生植物植物（即海带和海草）。在某些区域，大型底栖动物物种数量超过 460 种，而白海里的浮游植物物种数目超过 440 种。白海拥有两个特有鱼类亚种、大西洋鲑鱼的洄游路线及其丰富的种群。白海的海湾和岛屿为 17 种水鸟提供了繁殖地，并且成为常见绒鸭 (<i>Somateria mollissima</i>) 作为筑巢区。这个区域与东大西洋洄游路线重叠，因此，作为洄游走廊和临时停留区域，它具有极大重要性。冬季形成的冰间湖是若干海鸟的重要过冬地。就海洋哺乳动物而言，白海拥有竖琴海豹 (<i>Pagophilus groenlandicus</i>) 重要的觅食、产仔和换毛区，也是白鲸 (<i>Delphinapterus beluga</i>) 极为重要的交配地。</p>							
5. 巴伦支海东南部（伯朝拉海）	M	H	M	H	H	M	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
(它是排入北冰洋欧洲部分第二大河流)。伯朝拉河流入北冰洋的河水影响到这一区域，并且证明了某些生物学特征。伯朝拉海被称为拥有丰富且高产的底栖生物群落，伯朝拉河为这些生物群落带来了大量营养。底栖动物数量超过 600 个类群。位于卡拉和尤戈尔海峡的科尔古耶夫浅水区的记录生物总量超过每平方米 500 毫克，是在巴伦支海发现的最高值。这为海鸭和海象等底栖草食动物提供了优良的食物基础。水鸟是本区域的另一个显着生物学特征。伯朝拉海位于东大西洋迁徙路线的中心，是多数水鸟物种在其迁移的最后阶段的一个关键中途停留地。大部分水禽和其他水鸟不在本区域停留，但会大量使用海滩涂、避风港湾、沿岸区和毗邻海岸的丰富食物资源。一共大约有 130 种鸟类在此出现。伯朝拉海作为大西洋海象的一个关键栖息地，并为白鲸(自然保护联盟，脆弱物种)提供了一个重要的觅食地和回流路线。这里是北极熊常年的栖息地。除此之外，伯朝拉海盆还拥有北极加拿大白鲑(<i>Coregonus autumnalis</i>)的唯一欧洲种群，是一个重要的伯朝拉大西洋鲑鱼种群的重要洄游区。它还是极地鳕鱼的主要产卵区。							
6. 诺瓦亚赞姆亚西部和北部海岸	M	H	-	M	H	-	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域涵盖了峡湾沿海地区和一般 100 米等深线以内毗邻大陆架（诺瓦亚赞姆亚北岛最北部分除外，那里较深的地方非常接近岸边）。本区域位于俄罗斯的领海和专属经济区内。 诺瓦亚赞姆亚西部和北部的巴伦支海海岸是一个基于波动极锋区和边缘浮冰区的高产海区。大西洋和北冰洋水团在此交汇，形成极锋，其特点是温度和盐度变化率很大，且其位置沿东巴伦支海波动，从而导致整个海岸诺瓦亚赞姆亚西部海岸的生产力提高。导致高产的另一个特征是边缘浮冰区，而它在这一区域内随季度在移动。该区域为巴伦支海鳍足类和鲸类动物等常见物种提供了觅食地，并且为须海豹 (<i>Erignathus barbatus</i>) 和环斑海豹 (<i>Phoca hispida</i>) 提供了繁育地。诺瓦亚赞姆亚西海岸的沿岸水道和上层浮冰系统应该是卡拉白鲸种群以及可能的大西洋海象的春季洄游路线。该海域的高生产率支持了东北大西洋最大的海鸟群，包括常见绒鸭的大量繁殖种群。珍稀 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
和濒危物种/生境包括受威胁分期和换羽理由的虎头绒鸭和长尾鸭的中间停留地和换羽地（斯皮尔斯和劳克林，2010 年）。在西部海岸的一些地方，其底栖生物量超过每平方米 1000 克，因此，本区域成为大西洋海象的重要觅食地。在冬季，诺瓦亚赞姆亚西海岸的边缘浮冰区、冰间湖和沿岸水道都是海鸟和北极熊的重要过冬地。							
7. 巴伦支海东北部-喀拉海	M	H	H	H	H	-	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域涵盖弗兰兹 - 约瑟夫地群岛和北地群岛的北极俄罗斯群岛以及几个近海岛屿、内海群岛水域和内海、毗邻俄罗斯领海和专属经济区。 本区域是大西洋地区特有、原始和脆弱的高纬度北极海洋生态系统的一个例子。其地形由一个群岛大陆架和有众多深水峡谷的毗邻岩床断裂带组成；边缘浮冰区在一年期间要从本区域通过。其表面水域是典型的北极水域，大西洋海水沿大陆斜坡流动并丰富了本地生物群落和生物生产力。本区域拥有大量典型北极物种（例如，海鸟、海洋哺乳动物、底栖无脊椎动物），并且拥有若干全球受威胁鸟类和海洋哺乳动物物种的核心区域。 							
8. 鄂毕-叶尼塞河口	H	H	M	M	H	L	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域包括大西伯利亚鄂毕河和叶尼塞河河口和三角洲，以及它们的外海区。鄂毕湾是俄罗斯北极地区最大的河口，从鄂毕河三角洲到北部中南部喀拉海海口长达近 1000 公里。叶尼塞湾是继鄂毕湾之后的第二大河口。 鄂毕湾和叶尼塞湾形成北极地区最大的河口区。这里的大陆河水流出量是北极海域记录中最大的。大量的淡水、温暖的河水导致喀拉海最大部分的上层海水中盐度出现不稳定。前部区域初级生产量高，维持了大量淡水和半溯河性鱼类种群、水生鸟类和水禽。溯河和半溯河产卵的物种通过河口进行季节性洄游，而河口区外侧部分的固定冰则成为极地鳕鱼的一个重要产卵区。本区域的沿海区的特点是生物和景观多样性非常高（从沙滩到苔原或的海岸系统，或“laidas”的沿海瞬变生境系统）。这里是大多数 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
生物热点都注意到的区域。 本区域养育了多种水鸟物种。其中大多数都与非繁殖季节期间的海洋生境有着比较密切的关系。这些物种中包括像虎头绒鸭（ <i>Polysticta stelleri</i> ）、凫绒鸭（斑脸海番鸭）和长尾鸭（ <i>Clangula hyemalis</i> ）等全球濒危物种，它们在苔原上繁殖但在非繁殖期间主要以沿海水域为生。河口还为海鸭、鹅和天鹅提供换羽和觅食地，包括王绒鸭、长尾鸭、海番鸭、暗腹黑雁鹅和毕威克天鹅。本区域还是其外侧部分出现的白鲸和北极熊的重要夏季觅食地。							
9. 大西伯利亚冰间湖 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于拉普捷夫海内，并且与拉普捷夫海处于东泰梅尔与新西伯利亚群岛北部区域（与东西伯利亚海的边界上）之间的中间岩床上形成的大部分冰间湖相对应。本区域完全位于俄罗斯联邦的专属经济区内。 拉普捷夫海中的冰间湖系统以及新西伯利亚群岛水域特殊条件的特征是自然程度高，有限的航运是唯一的人类活动。其最显着的特征是拉普捷夫海海象。这种海象先前被认为是特有亚种（<i>Odobenus rosmarus laptevi</i>），但最新分子遗传学研究未能证明其与太平洋亚种（<i>O. rosmarus divergens</i>）隔绝。不过，拉普捷夫海海象确实是一个不同于邻近太平洋种群的特殊种群，没有长期季节性洄游和过冬地。 本区域对恢复极地鳕鱼（ <i>Boreogadus saida</i> ）发挥重要作用，而极地鳕鱼是高纬度北极生态系统中大部分顶级掠食者的主要食物。拉普捷夫海冰间湖养育了由厚嘴海鸦（ <i>Uria lomvia</i> ）和黑足三趾鸥（ <i>Rissa tridactyla</i> ）为主的生物群体链。在春季迁徙期间，这些冰间湖是虎头绒鸭等鸟类的家园。拉普捷夫海冰间湖网也维持大量稳定的海豹种群，而这些海豹又引来了其主要天敌：北极熊。	H	H	M	H	H	M	H
10. 弗兰格尔 - 杰拉德浅滩和拉特曼诺夫环流	M	H	H	H	H	H	H

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域从弗兰格尔岛周围水域沿德龙海峡中间线向西经 180 度延伸，然后沿 30 米等深线向杰拉德岛延伸，包括杰拉尔德海沟的一部分，并延伸到 Cape Serdtse-Kamen 东部约西经 173 度处。北边边界通常沿 100 米等深线。这个区域位于俄罗斯联邦的专属经济区和领海之内。 弗兰格尔 - 杰拉德浅滩和拉特曼诺夫环流是楚科奇海中俄罗斯部分的一个岩床区域。与俄罗斯北极海域大多数岩床不同，它不受大欧亚河流流量的影响。大部分区域被来自白令海的海水填满，这些海水是通过白令海峡的季节洋流进来的，并且在楚科奇海内循环。这是该区域东部的一个稳定的大型环流（被称为拉特曼诺夫环流），它使各种环境处于稳定状态，提供了大量营养，并使大量初级产物流到底部，成为稳定和持续底栖生物群落的基础。深海底栖动物和海底动物的生物量非常高。在弗兰格尔岛周围形成了陆地固定冰和冰间湖。弗兰格尔岛以外冰间湖的形成是北极和西伯利亚反气旋之间相互作用的结果。该区域基本上是没有人类活动的地方。 <p>在春季，本区域成为每天有数百只北极露脊鲸的洄游路线，并且在夏季和秋季成为白鲸、北极熊、太平洋海象和灰鲸的洄游路线。不过，本区域没有特有物种得到证明，只有还不甚了解的若干被称楚科奇海的物种在这里出现。在冬季，毗邻弗兰格尔岛的冰间湖形成一个拥有大量环斑海豹 (<i>Phoca hispida</i>) 和须海豹 (<i>Erignathus barbatus</i>) 及其掠食者 - 北极熊 (<i>Ursus maritimus</i>) 的区域。本区域成为海鸟、海象和鲸目动物的觅食区。</p>							
11. 楚科奇沿海水域 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域从东西伯利亚海 Ayon 岛的西部和北部边缘延伸，包括恰翁湾（俄罗斯恰翁斯卡亚湾）和科柳钦湾（俄罗斯科柳钦斯卡亚湾），传统上延伸到典型海岸 35 米处。它完全位于俄罗斯联邦（内河入海口、领海和专属经济区内海洋水域）的管辖范围内。 	M	H	H	H	H	H	H

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 这些水域常年大部分时间都有冰层覆盖，但海冰条件自西向东和从南到北各不相同。楚科奇海沿海不同于西伯利亚大陆架海域，其远洋初级生产力和流到海底的碳量增加。相较于大部分西伯利亚大陆架海区，恰翁湾及其他入海口和泻湖港湾海藻生物群落大大增加了沿海区域的生产力。在受到保护的海湾和河流入海口，沿海区域底栖生物量很高。有些生物群落特别罕见，即沿恰翁湾东部海岸生长的墨角藻状海藻群落、海藻、海带和贻贝床，它们是较温暖的全新世时期环境的遗物。 <p>有其特有生态系统的浅海湾和沿岸沼泽成为包括绒鸭、长尾鸭（<i>Clangula hyemalis</i>）和 alcids 鸭在内众多水鸟的脱毛和产卵区。在冬季，大部分楚科奇半岛沿海区域成为大量环斑海豹（<i>Phoca hispida</i>）和须海豹（<i>Erignathus barbatus</i>）及其天敌北极熊（<i>Ursus maritimus</i>）的活动区域。该区域还成为灰鲸（<i>Eschrichtius robustus</i>）加利福尼亚州 - 楚科奇种群和北极露脊鲸（<i>Balaena mysticetus</i>）的洄游路线。</p>							

表 6. 对西北大西洋地区符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的区域的描述

(详细内容载于《促进描述具有重要生态或生物意义的海洋区域 (EBSAs) 的西北大西洋区域讲习班报告》的附件四的附录, UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/2/4)。

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
1. 拉布拉多海深对流区	H	M	-	M	L	L	M
<ul style="list-style-type: none"> • 地理位置: 本区域位于拉布拉多海深海盆的中央环流之中。该区域没有固定的地理坐标; 相反, 它的划界是根据物理海洋学属性动态确定的。 • 拉布拉多海是全球海洋环流系统的重要组成部分。它是北大西洋冬季深层海水交换表层海水的深对流作用的唯一所在地。在对流过程中, 二氧化碳、氧气和有机碳等海水成分从表面输送到深层。这个区域还为成年飞马哲水蚤提供了中水越冬避难所, 而飞马哲水蚤则是养育拉布拉多岩床及更远的下游区域浮游动物种群的一个关键物种。海洋-冰-大气相互作用的逐年变异性导致对流强度和程度的剧烈的年际变化。然而, 从长远来看, 亚极表层海水的持续变暖和淡化很可能是导致整个对流弱化的一个因素。因此, 人们可能会期望通过西北大西洋生态系统扩大这一领域内的显著生态变化。 							
2. 南拉布拉多海海鸟觅食区	M	H	M	M	M	M	M
<ul style="list-style-type: none"> • 地理位置: 本区域位于拉布拉多海南部、纽芬兰东北部。已查明的海鸟栖息地跨越加拿大专属经济区和毗邻远洋水域, 但被描述为符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的区域仅限于远洋部分。每个海鸟物种所使用的具体区域很可能随季节和年度变化而变化, 因此, 从性质上讲, 这个区域是动态的。 • 纽芬兰和拉布拉多以外水域养育了全球重要的海洋脊椎动物, 包括估计每年有 4000 万只海鸟。近期的很多跟踪研究突出了南部拉布拉多海的重要性, 特别是作为海鸟觅食生境, 包括越冬黑腿三趾鸥 (<i>Rissa tridactyla</i>) 和厚嘴海鸦 (<i>uria lombia</i>), 并且养育了利奇的风暴海燕 (<i>Oceanodroma leucorhoa</i>)。这种生境跨越了南部的孤儿盆地到北纬 56 度, 包含大陆架、斜坡和毗邻近海水域。而养育这些海鸟的生境则横跨加拿大专属经济 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
区和毗邻国家管辖范围以外区域，这种描述代表了位于远洋区域内的部分，其中代表 20 个种群的三个海鸟物种的核心觅食和越冬区相互交织。							
3. 孤儿海丘	H	-	-	H	L	H	H
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于北大西洋，弗莱明海角北部，并从水下不到 1,800 米深处上升到海面。孤儿海丘是一个不规则形状的地貌，因东南部毗邻的一个海山而得名。边界沿孤儿海丘和小海山而划，以便将这两种地貌都包括进去。东部沿 4,000 米等深线，南部和西北部沿 3,000 米等深线。在东南边，与 3,000 米和 4,000 米等深线连接，以便包含 4000 米等深线附近的小型地貌。在西部，沿等深线（约 2,750 米）划界，以期将 3000 米等深线与北部和南部之间孤儿海丘的斜坡包括进去 孤儿海丘提供了一个硬地层岛屿，并且成为一个独特且复杂生境：从孤儿盆地周围深海松软沉积物中升起的岛屿。由于被隔开，海山往往养育特有生物种群和独特的动物群组合。虽然孤儿海丘与相邻的大陆斜坡接近，但它更深，且似乎拥有独特的动物群系。在进行水下拍照和录像调查期间，已在孤儿海丘发现了脆弱且长寿的珊瑚和海绵。泰勒锥形循环已得到确定，为保持这一地貌上的幼虫提供了一个机制。 							
4. 弗莱明海角和格兰德沙洲的斜坡	H	M	H	H	M	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域以 600 米和 2,500 米等深线为界，并且位于加拿大专属经济区范围以外。 纽芬兰的弗莱明海角和格兰德沙洲斜坡包含西北大西洋渔业组织（渔业组织）监管区的国际水域中已查明脆弱海洋生态系统中的大多数群聚分类指标。这个区域还包括所有当前西北大西洋渔业组织保护其监管区域内珊瑚和海绵的保护区，并且是国际水域中格陵兰大比目鱼渔场的一个组成部分。它也是很多受威胁和被列入濒危物种清单的物种的栖息地。在被描述为符合具有重要生态或生物意义的海洋区域内发现了大量海洋类群生物 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
多样性。							
5. 东南浅滩和格兰德班克尾部上的毗邻区	H	H	H	M	H	H	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于纽芬兰东南部格兰德班克的南部。该地区从 200 海里（加拿大专属经济区）向 100 米等深线延伸。 东南浅滩和毗邻区（简称“格兰德班克的尾部”）是一个高生产力的生态系统，维持了一个动态的海洋生物网达数百年。东南浅滩是一个古老的海滩遗址，提供了一个水浅、比较温暖、沙质生境，是特有近海毛鳞鱼的产卵地。该地区还是美洲黄盖鲽的幼仔成长地，也是已经消失的美国欧蝶、已经消失的大西洋鳕鱼和条纹狼鱼（被加拿大联邦濒危物种法案列为特别关注物种）的产卵地。这也出现过紫贻贝和蛤楔形的特有种群。由于有丰富的饵料鱼的存在，“尾巴部”是包括座头鲸和长须鲸在内很多鲸类动物的重要觅食区，并且有大量的海鸟经常来此，包括在非繁殖季度从超过 15,000 公里远的南大西洋繁殖地飞到这里觅食的物种。 							
6. 新英格兰和科纳里塞海山	H	H	-	M	-	H	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域包括以新英格兰和科纳里塞海山山脉命名的海山。鉴于这两个海山山脉之间相距约 300 公里，这一区域包括这两个山脉的独立多边形。新英格兰海山地貌延伸到美利坚合众国的专属经济区，但这里所描述的区域完全在国家管辖范围以外。 新英格兰和科纳里塞海山是罕见的硬基地层岛屿，拥有从深海上升到浅海的独特复杂生境，有一个地方离水面不到200米。由于其被隔离，海山往往拥有特有生物群落和独特的动物种群。新英格兰和科纳里塞海山山脉都拥有复杂的珊瑚和海绵群落，包括众多特有物种。与周围深海区域相比，底栖多样性非常高。海山山坡和更深层次海峰环境（距离水面超过2,000米）目前仍然没有受到人类活动的任何直接影响，尽管有些较浅海山已有商业捕捞活动。 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<p>7. 热液喷口区</p> <ul style="list-style-type: none">• 地理位置：本区域沿大西洋中部海脊走向，从北纬 30.125°西经 42.1183°的失落之城热液喷口区一直到北纬 23.3683°西经 44.95°蛇坑热液喷口区。整个地貌位于国家管辖范围以外。• 热液喷口是以温度高于周围深海区为主要特点且具有富硫化学特征的特有生境。少数地方性物种适应这些恶劣环境，并且可以高密度生长。这一区域沿大西洋中部海脊走向，从失落之城热液喷口区起，并且包括已经得到证实的 Broken Spur 和 Transverse-Atlantic Geotraverse 活热液喷口。据估计，失落之城热液喷口区一直活跃了 30,000 多年，拥有独特的特点，是一个低温高碱热液喷口。	H	H	-	H	H	H	H

表 7. 对地中海地区符合具有重要生态或生物意义的海洋区域标准的区域的描述

(详细内容载于《促进描述具有重要生态或生物意义的海洋区域 (EBSAS) 的地中海区域讲习班报告》附件四的附录, UNEP/CBD/EBSA/WS/2014/3/4)。

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
1. 北亚得里亚海	M	H	H	M	H	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置: 位于意大利、斯洛文尼亚和克罗地亚海岸以外的亚得里亚海北部盆地的一部分。该区域大致以 9 米等深线划界, 包含连接安科纳 (科内罗) 和 Ilovik 岛的直线区域。该区域位于北亚得里亚海盆地北部, 平均水深 35 米, 受波河地幔柱的强烈影响。 它包括移动沙底、海草草场、硬底群丛和被称为 “trezze” 和 “tegnue” 的特有露出岩石。该地区对几种受威胁物种非常重要。它拥有最高密度的地中海宽吻海豚 (<i>Tursiops truncatus</i>) 种群, 是地中海蠵龟 (<i>Caretta caretta</i>) 的最重要觅食地之一, 是很多脆弱物种 (蓝鲨 (大青鲨)、沙洲鲨 (<i>Carcharhinus plumbeus</i>)、凤尾鱼 (<i>Engraulis encrasicolus</i>) 等) 的幼苗生长地。由于其从西部到东部沿海环境因素存在重要梯度, 该区域拥有大量底栖和浮游生境。它也是地中海上最高产的区域之一。 							
2. Jabuka/Pomo凹陷区	H	H	M	M	H	M	L
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置: 本区域涵盖三个最大水深分别为 270 米左右的不同相邻凹陷区。本区域从 200 米等深线向外延伸 4.5 海里。该区域包含相邻的凹陷区, Jabuka (或 Pomo) 凹陷区位于中东亚得里亚海, 拥有 200 至 260 米的最大水深。 这是一个敏感且极为重要的亚得里亚海底层资源产卵及育苗区, 尤其是欧洲鳕鱼 (<i>Merluccius merluccius</i>)。这个区域拥有的挪威龙虾 (<i>Nephrops norvegicus</i>) 的种群最多, 尤其 200 米以上深度对幼苗特别重要。基于现有科学数据, 它是巨型魔鬼鱼 (<i>Mobula mobular</i>) 高密度产区, 这种鱼是《关于地中海特别保护区和生物多样性的议定书》附件二所列以及自然保护联盟红色名录所列出的特有物种。该凹陷区可以为一些处于关键生活阶段的鼠鲨以及 <i>Lamna nasus</i> 提供良好环境, 这两种物种已经处于极度濒 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
危（自然保护联盟，2007 年）状态，都被列入《关于地中海特别保护区和生物多样性的议定书》附件二。关于底栖物种，可以看到几种类型的珊瑚（石珊瑚和海葵）。							
3. 南亚得里亚海爱奥尼亚直线区							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于南亚得里亚海盆地南部中心和爱奥尼亚海的北部。在西侧，它包括亚得里亚海的最深部分，并且包括阿尔巴尼亚沿海地区（Sazani 岛和 Karaburuni 半岛）。它还涵盖圣玛丽亚迪莱乌卡附近的斜坡。该区域位于南亚得里亚海盆地南部中心和北部爱奥尼亚海。 它的特点是坡陡，盐度高，最大深度在 200 米至 1500 米不等。与地中海的海水对流是通过奥特朗托海峡进行的，该海峡中有一个 800 米深的岩床。该区域拥有居维叶氏中喙鲸 (<i>Ziphius cavirostris</i>)（《巴塞罗那公约》框架内《关于地中海特别保护区和生物多样性的议定书》附件二所列物种）的重要生境，也是巨型魔鬼鱼 (<i>Mobula mobular</i>)、条纹海豚 (<i>Stenella coeruleoalba</i>)、地中海僧海豹 (<i>Monachus monachus</i>) 和蠵龟 (<i>Caretta caretta</i>) 等其他大型动物的重要生境，所有这些大型动物都已被列入《关于地中海特别保护区和生物多样性的议定书》附件二。底栖动物包括深海冷水珊瑚群落和深海海绵聚合，形成了重要的生物多样性库，并且促进了有机物质的营养循环。金枪鱼、旗鱼和鲨鱼也是这个区域常见的物种。 	H	H	H	H	M	H	M
4. 阿尔及利亚-突尼斯边缘区							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本海域位于阿尔及利亚贝贾亚省 Pisan 岛和突尼斯 Galite 岛东部垂直面之间。它的西部位置是 Gouraya 国家公园（Pisan 岛）海洋部分的西部边界及其东部部分与 Galite 岛东部直线相对应。阿尔及利亚-突尼斯边缘区位于阿尔及利亚和突尼斯在西地中海盆地的东部水域之间。 本区域包括 Taza-Banc des Kabyles 对地中海有重要性的特别保护区、五个沿海国家公园的海域、一个人与生物圈计划/教科文组织沿海湿地和西地中海盆地东南部最大的岛屿以 	H	M	H	H	H	M	H

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
及格利特群岛。该区域的重要性在于它对迁徙海鸟的重要意义，其中有许多濒危物种栖息在其沿海湿地。这个区域还拥有集中了《巴塞罗那公约》55% 保护物种以及在地中海被视为自然遗产或作为敏感和/或具有高生物生产力的生境而受到保护的多数生境的地貌。这些生境也是包括迁移在内具有重要生态或生物意义的进程的所在地。该区域还包括尚未被研究的峡谷；不过，其生态价值可能构成一个补充要素。它被视为敏感区域，至少有五个已知的地中海海洋生物多样性的热点。							
5. 阿尔沃兰海及相连区域							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域是以《巴塞罗那公约》和《保护地中海海洋植物群落行动计划》西部边界为界，东部与阿吉拉斯海角（西班牙）形成一条直线一直到奥兰（阿尔及利亚）附近区域。该区域包括直布罗陀海峡、阿尔沃兰海及向东与西班牙、摩洛哥和阿尔及利亚相连的区域。 本区域水文条件复杂，成因是大西洋和地中海水域在此交汇加上多种海底地貌、具有异质岩床、各种岛屿和大量海山斜坡、海底峡谷以及由热液喷口形成的泥质结构。这些地貌便于大量生境和物种的存在，其中包括大量濒危/脆弱生境和濒危物种。由于其所在地理的原因，这种由典型的大西洋（欧洲和非洲西北部）和地中海物种交汇形成的生物多样性热点区也包含若干特有无脊椎动物（直布罗陀和阿尔沃兰海海峡）和海鸟以及大量地方特有物种。此外，它还为大型中上层鱼类（蓝鳍金枪鱼）、海龟和海洋哺乳动物洄游提供一个必经之路，并且是若干受威胁鲸类动物和海鸟具有重要生态或生物意义的繁殖和觅食区。在这一区域，已经宣布了 6 个对地中海有重要性的特别保护区，并且还有一个即将宣布（阿尔沃兰海山）。 	H	H	H	H	M	H	M
6. 西北地中海中上层生态系统							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于从南巴利阿里群岛到利古里亚海的区域，包括狮子湾和第勒尼安海的一部分。 	H	H	H	H	H	H	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
<ul style="list-style-type: none"> 本区域的特点是其拥有能够使其承载相比而言特别多物种多样性和丰度地貌和海洋特性。本区域的海洋水团是其生产力和重要生物和生态意义的基础。对于包括金枪鱼和类金枪鱼在内的某些大型中上层鱼类种群而言，西地中海就是一个重要的繁殖和觅食区。来自大西洋的海龟（<i>Caretta caretta</i> 和 <i>Dermochelys coriacea</i>）以及来自东部和中部地中海的蠵龟主要分布在该岛的北部和加泰罗尼亚海。巴利阿里群岛是两个海龟种群之间的连接区。该区域还包括 63 个重要鸟类区，并且拥有地方特有的巴利阿里海鸥和 Audouin 鸥的重要群体。 							
7. 西北地中海底栖生态系统 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于意大利、摩纳哥、法国和西班牙海岸以外。该区域的水深范围约为 2,500 米，占地面积 196,000 平方公里。 从海洋学条件、地貌和生态系统来讲，本区域既是西部盆地特殊性的代表，也是拥有单一营养网的生态系统的代表。凭借其海底、岩床和斜坡的广泛地貌特征，本区域拥有很多具有从中滨海带到半深海区相关保护重要性的生境，并且拥有以工程师物种（即改变其环境的物种）为特征的重要生物多样性。大多数物种和生境都是脆弱的，且都以复原力低为特点。 	H	M	H	H	M	H	M
8. 西西里海峡 <ul style="list-style-type: none"> 地理位置：西西里海峡位于西西里岛和突尼斯之间，包括潘泰莱里亚（意大利）、佩拉杰群岛和兰佩杜萨（意大利）以及马耳他、戈佐和科米诺岛（马耳他）。 在这一区域，有西部和东部地中海盆地之间的水体和生物体交流。在更广阔的海峡内，有重要生态和生物组成成分相对有限的区域空间内共存，被认为是地中海中生物多样性热点地区。西西里岛附近有海山和深海珊瑚，包括属于脆弱物种的白珊瑚护堤，并且为很多物种提供重要生境。在这一区域，复杂的海洋条件导致生产力很高，并为鱼类产卵提供了良好条件，使得西西里海峡成为包括蓝鳍金枪鱼、旗鱼和凤尾鱼在内很多具有重 	M	H	H	H	M	H	L

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
要商业价值的鱼类以及一些底栖鱼类的重要产卵场。该区域也被认为是濒危白鲨的重要幼苗成长地。西西里海峡被认为是极度濒危马耳他鳐鱼的最后一个重要生境。							
9. 加贝斯湾							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：加贝斯湾拥有626公里长的直线海岸线，由三个大地貌为代表：（1）本区域包含大量沿海地层（盐滩、海滩、泻湖、沙丘和湿地）和沿海生态系统（绿洲、河谷和特有植被群落）；（2）北以Ras Kaboudia为界、南以与利比亚边界为界以及东以50米等深线为界的海洋区域。这里有很多岛屿生态系统，其中最重要的是杰尔巴、Kerkennah和Kneiss岛生态系统；（3）加贝斯湾地区，占到突尼斯海岸的33%。 加贝斯湾的海岸线是以地势低洼的沙地、沙地/泥泞海岸或甚至沼泽海岸为特征。加贝斯湾是地中海海洋动物幼苗生长地和孵化器，而且波西多尼亞海草(<i>Posidonia oceanica</i>)生物群落被认为是世界最大的。波西多尼亞海草形成加贝斯湾最具特色和最重要的海洋生态系统，并且在多个方面受到威胁。加贝斯湾的海草草场是地中海最大的。本区域有与地中海海草相关的大部分底栖生物群落。加贝斯湾潮汐的高度是地中海中独一无二的，在那里，这种现象几乎不存在。中海海水层的垂直幅度独一无二，具有独特的生物多样性和多样化的动物。加贝斯湾已详细记载的物种数量达1 658种，占地中海已查明全部物种的14.8%。无脊椎动物种类最多，在加贝斯湾已经发现的特有生物多样性中约占68%。鉴于其特殊的生物、生物地理和气候特征，这一区域被认为是观察地中海其他地区未来气候变化可能产生的后果和影响的活实验室。 	H	M	H	H	M	M	M
10. 苏尔特海湾							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域由大约 750 公里海岸线组成，并且包括米苏拉塔和班加西之间的海域，拥有地中海海岸最南端沙滩。 苏尔特海湾是南地中海沿岸一个非常大的自然区域，完全位于利比亚国家管辖范围内。其自然特性为蠵龟 (<i>Caretta caretta</i>) 和小凤头燕鸥 (<i>Sterna bengalensis emigrata</i>) 等几 	M	H	H	H	H	H	H

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
种濒危或受威胁物种的繁殖提供了良好的沿海生境。该区域对金枪鱼 (<i>Thunnus thynnus</i>) 和许多软骨鱼类等大量中上层鱼类各个生命阶段、养护和生产率都极其重要，其中包括许多被《巴塞罗那公约》附件二列为濒危和受威胁的物种。本区域也是蓝鳍金枪鱼的六个产卵区之一。							
11. 尼罗河三角扇							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于地中海东部沿岸的南部，包括尼罗河三角洲和西奈半岛以外的大陆架和斜坡。 东地中海尼罗河三角扇的生态和生物学意义源于该区域的地质特征和自然现象（尼罗河的淤泥沉积、物理和生物海洋学及气候特点）。本区域的重要地貌特征包括高活性冷泉、峡谷（亚历山大峡谷）、冲积扇、悬崖和大陆架。关于本区域深海底栖生境的知识稀缺，但已知本区域拥有与气态烃化学共生生物群落有关的特有生境。本区域是由特有软体动物和多毛类物种组成的脆弱生态系统的家园。此外，据预测，本区域也有深海珊瑚群落生长。本区域的生物多样性指数也相当高（得分 38，满分 50 分），因为本区域是浮游和底栖生物群落主要组成部分的家园。与蓝鳍金枪鱼渔业活动一样，本区域的小型中上层渔业活动非常重要；此外，尼罗河三角扇被称为地中海蓝鳍金枪鱼为数不多的产卵地之一。另外，由于其生产率高，中上层鱼类和海龟聚集在本区域的岩床部分，使其也成为鸟类的觅食地和繁殖地。 	H	H	H	H	H	M	
12. 东地中海东部峡谷							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：东地中海东部峡谷位于黎巴嫩和叙利亚海岸沿线。东地中海东部峡谷是一个由深峡以及热液喷口和海底淡水泉组成的系统，并且具有特别重要的生物意义。地中海东部沿海区拥有最大的后鳃目软体动物地层区，且其水域冬季水温最高，使它能够成为软骨鱼类、海洋哺乳动物、爬行动物和硬骨鱼类等许多重要生物物种的避难所和产卵地（其中有很多物种已被列为自然保护联盟红色名录的脆弱/濒危物种）。 	H	H	H	H	-	H	M

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
13. 地中海东北海域	M	H	H	M	-	-	-
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域位于希腊、土耳其、塞浦路斯和叙利亚之间东北地中海海域。 本区域包括重要的生物学特征。其中包括蓝鳍金枪鱼 (<i>Thunnus thynnus</i>) 以及海龟 (<i>Caretta caretta</i>) 和绿海龟 (<i>Chelonia mydas</i>) 和地中海僧海豹 (<i>Monachus monachus</i>) 等濒危物种的产卵地。本区域还有接近受到威胁的地中海鸥 (<i>Larus audouinii</i>) 和欧洲鹭鸶（蓝眼鸬鹚 <i>desmarestii</i>）的地中海特有亚种。 							
14. 阿卡马斯和赫里索胡湾	H	H	H	H	-	M	M
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域由两个地方组成：阿卡马斯和波利斯/亚利亚。阿卡马斯岛屿的西部和西北海岸是其延伸部分。波利斯-亚利亚的海洋部分是一个几乎统一的沙质或沙/鹅卵石海滩向 50 米等深线的延伸。 阿卡马斯包括绿海龟和蠵龟的重要巢居海滩以及僧海豹休息和繁殖地所在岩石海岸的毗邻洞穴。它包括 <i>Vermetus</i> (<i>Dendropoma</i>) 珊瑚礁和广阔的波西多尼亚草地。该岛西海岸的 <i>Lara/Toxeftra</i> 海龟自然保护区是一个 Natura2,000 保护地，也是《巴塞罗那公约》之下的一个对地中海有重要性的特别保护区。波利斯-亚利亚保护区是蠵龟的重要交配和筑巢区，也是幼年和成年绿海龟的交配和觅食地，并且拥有广泛的波西多尼亚草地。 							
15. 希腊海沟	H	H	H	H	H	-	-
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域包含中地中海次区域（东爱奥尼亚海）一部分和东地中海次区域（地中海东部海域）的一部分。本区域从希腊伊奥尼亚群岛到克里特岛南部延伸，并进一步沿东北方向向安纳托利亚西南海岸延伸。 本区域是将地中海中部与东地中海连接起来的主要海底地貌。由于其地貌条件的特殊性，它对东地中海受威胁、深潜海洋哺乳动物的生存非常重要。此外，由于本区域东部（罗得岛环流）特殊海洋条件，本区域也对拥有极贫营养背景的地中海东北海域的生物 							

海域的地理位置及概况	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7
	关于标准的略语见第 2 页						
生产力有利。							
16. 中爱琴海							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：本区域从巴巴卡勒（在土耳其大陆上，莱斯沃斯的希腊岛北面）开始延伸，横跨爱琴海延伸到西部，包括斯克儒斯岛。西部边界向南沿阿提卡海岸线延伸到法尔科奈拉无人岛，然后沿着基克拉泽斯群岛的南部岛屿，沿希腊火山弧直到罗得岛。它沿罗得岛北部海岸线直到土耳其海岸线。土耳其海岸线成为本区域的东部界线。 中爱琴海的特点是拥有数百个小岛和海湾，形成一个拥有丰富生物多样性的多种生境。重要的生物学和生态学特征包括拥有海草甸和珊瑚地等脆弱生境，为一些稀有或脆弱物种（如僧海豹、各种鸟类、鲸鱼和鲨鱼）等提供栖息地和极其重要繁殖区。该地独特的地貌特征包括热液喷口、盐水渗漏以及海底火山。由于本区域具有丰富的生物多样性且拥有许多脆弱物种，故很多地方都受到法律保护。 	M	H	H	M	L	H	M
17. 北爱琴海							
<ul style="list-style-type: none"> 地理位置：所述地区位于希腊和土耳其国家管辖之内的北爱琴海和超出国家管辖的水域。 本区域因跨境河流的河水、上升流和来自黑海含丰富营养的水的流入而具有很高的生产力。该区域包括爱琴海的一些最重要的渔场。这里有鲸类和珊瑚等稀有物种，并且是地中海最大的海洋公园之一，该海洋公园拥有重要的地中海僧海豹种群。 	H	H	M	L	H	H	L
